

위험 구분	지정제2류의약품
약효 분류	구내염용 약
제품 이름	アフタッチA AFTACH A
제품의 특징	<p>● 바르는' 구내염 치료약입니다. 구내염을 제대로 보호하고 약 성분이 서서히 방출되어 환부에 작용합니다.</p> <p>● 약을 바르면 잠시 후 젤리 타입이 되어 자연스럽게 녹아 사라집니다.</p>
사용상의 주의	<p>■ 해서는 안 되는 것 (지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용 일어나기 쉽다)</p> <p>1. 다음에 해당하는 사람은 사용하지 말 것</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 감염증이 구내염이 의심되는 사람. (의사, 치과 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담해 주십시오) · 거즈 등으로 문지르면 쉽게 벗겨낼 수 있는 흰 반점이 구강내 전체에 퍼져 있는 사람. (칸디다 감염증이 의심된다) · 환부에 노란 고름이 있는 사람. (세균 감염증이 의심된다) · 구강 내에 쌀알~팥 크기의 작은 물집이 다발하고 있는 사람, 구강 점막 이외의 입술, 피부에도 물집, 발진이 있는 사람. (바이러스 감염증이 의심된다) · 발열, 식욕부진, 전신 권태감, 림프절 종창 등의 전신 증상을 보이는 사람. (바이러스 감염증이 의심된다) <p>(2) 구강 내에 감염을 동반한 사람.(스테로이드제 사용에 의해 감염증이 악화되었다는 보고가 있으므로, 치조농루, 치은염 등과 같은 구강내 감염이 있는 부위에는 사용하지 마십시오.)</p> <p>(3) 5일간 사용해도 증상의 개선이 보이지 않는 사람.</p> <p>(4) 1~2일간 사용해도 증상의 악화를 보이는 사람.</p> <p>■ 상담할 내용</p> <p>1. 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 치과 의사 약사 또는 등록판매자와 상담할 것</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람. (2) 약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람. (3) 임신부 또는 임신중이라고 생각되는 사람. (4) 수유 중인 사람. (5) 환부가 넓은 범위 에 있는 사람. (6) 고령자. <p>2. 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과 의사 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.</p> <p>관계부위: 증상</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구강내: 백반 (칸디다 감염증이 의심됨), 환부에 노란 고름 (세균 감염증이 의심됨), 미각 이상, 저린 느낌 ○ 기타: 알레르기 증상 (발진, 발적, 가려움, 부종 등) <p>3. 본제 사용후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 감염증에 의한 구내염이나 다른 질환에 의한 구내염이 의심되므로, 사용을 중지 하고 의사, 치과 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담해 주십시오.</p> <p>발열, 식욕 부진, 전신 권태감, 림프절 종창, 수포(구강내 이외), 발진·발적, 가려움, 구강내 환부가 본제로 다 감쌀수 없을 정도로 넓은 범위로 확산, 눈의 통증, 침침한 눈, 외음부궤양</p>
효능 또는 효과	구내염(애프터성)
용법 및 용량	<p>1 환부에 다음 횡수를 환부 점막에 부착시켜 사용합니다.</p> <p>[연령: 1일 복용횟수]</p> <p>성인(15세 이상)과 5세 이상의 소아 : 1 환부에 1회 1정, 1일 1~2회 흰색면을 환부 점막에 부착시켜 사용합니다.</p>
용법 및 용량에 관한 주의	<p>[1] 정해진 용법·용량을 준수해 주십시오.</p> <p>[2] 본제는 시간이 지나면 자연스럽게 녹아 없어지므로, 무리하게 벗겨내지 마십시오.</p> <p>[3] 통증이 가라 앉으면 사용을 종료해 주십시오. (사용중인 것을 벗겨낼 필요는 없습니다.)</p> <p>[4] 어린이가 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 사용하게 할 것.</p> <p>[5] 5세 미만의 유아에게는 사용하지 않도록 하여 주십시오.</p> <p>[6] 소아에 대한 사용은 부착 후에 손가락으로 벗겨낼 우려가 있으므로 주의해 주십시오.</p> <p>[7] 본제는 구강점막 부착제이므로 복용하지 마십시오. 복용해도 효과는 없습니다.</p> <p>[8] 만약 실수로 삼켜버린 경우, 새로운 약을 환부에 다시 부착시켜 주십시오. 만일 증상이 바뀌거나, 불안한 점이 있으면 의사, 치과 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담해 주십시오.</p> <p>[9] 본제는 사용방법이 잘못되면 부착되지 않을 수 있으므로, 사용방법을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 사용 부위에 따라서는 잘 부착되지 않는 부위가 있으므로, 잘 부착할 수 없는 경우는 의사, 치과 의사, 약제사 또는 등록판매자와 상담해 주십시오.</p> <p>[10] 사용하는 것을 잊어버린 경우에는, 알게 되었을 때 최대한 빨리 부착시켜 주십시오.</p> <p>[11] 본제의 흰색면이 침으로 젖게 되면 약의 부착이 나빠지므로, 그 경우는 구내염이 생긴 부분에 티슈나 거즈 등을 가볍게 대어 침을 빨아낸 후, 새로운 약을 다시 부착시켜 주십시오.</p> <p>[12] 본제를 환부 점막에 부착시킨 후, 혀 등으로 세계 만지면 벗겨질 수 있으므로 주의해 주십시오.</p> <p>[13] 정제 꺼내는 방법</p> <p>정제가 들어있는 포장 시트의 불룩한 부분을 손가락 끝으로 세계 밀어내 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫고, 꺼내 복용하십시오.(잘못하여 그대로 삼키면 식도 점막에 꽃히는 등 뜻밖의 사고로 이어질 수 있습니다.)</p>
성분 및 분량	<p>1정중</p> <p>트리암시놀론아세토이드 : 0.025mg : 환부의 염증을 가라앉히고 구내염을 개선시켜 줍니다.</p>
첨가물	하이드록시프로필셀룰로스, 카르복시비닐폴리머, 스테아린산 마그네슘, 젤당, 카르멜로오스칼슘(CMC-Ca), 탭크, 메타규산알루미늄마그네슘, 황색 제5호
보관 및 취급상의 주의	<p>[1] 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.</p> <p>[2] PTP 시트에서 본제를 꺼내면 신속하게 사용해 주십시오.</p> <p>[3] 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</p> <p>[4] 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 염려가 있습니다).</p> <p>[5] 사용 기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.</p>
고객 서비스 데스크	<p>본제품에 관한 문의는, 매입의 가게 또는 하기에 부탁 말씀드립니다.</p> <p>고객 상담 창구[사토제약주식회사]</p> <p>전화 03-5412-7393 접수 시간 9:00~17:00 (토, 일, 공휴일 제외)</p> <p>전화로의 문의는 일본어만이 됩니다.</p>
AFTACH A 의 사용 방법	<p>[1] 본제가 대상으로 하는 '구내염 (애프터성)' 은 볼 안쪽이나 혀, 입술 뒷쪽 등에 주위가 빨갛고 가운데가 얇게 패인 흰 원형의 통증을 동반한 알고 작은 궤양 (직경 10mm 미만)이 1~수개 생긴 염증의 총칭입니다.</p> <p>[2] 구내염이 생긴 부분에 티슈나 거즈 등을 가볍게 대 타액을 닦아 주십시오 (약을 바를 부분이 타액으로 젖어 있으면 약이 잘 부착되지 않을 수 있습니다).</p> <p>[3] 손가락 끝에 소량의 타액을 발라 약의 오렌지색 면에 손가락 끝을 가볍게 대 약을 부착시켜 주십시오.</p> <p>[4] 거울을 보면서 흰색 면 (주성분 함유)이 구내염 부분을 덮도록 조심스럽게 부착시켜 주십시오. 흰색 면이 타액 등으로 젖으면 환부의 접착성이 나빠지므로 잘 부착되지 않는 경우는 새로운 약을 다시 부착해 주십시오.</p> <p>[5] 아래 부분은 특히 약을 잘 바르기 힘든 부분이므로 손가락 대신 면봉 등을 사용해 부착해도 상관 없습니다.</p> <p>혀 뒷부분, 잇몸 표면 등 울퉁불퉁해서 잘 바르기 힘든 경우는 의사나 치과의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담해 주십시오.</p> <p>[6] 약을 구내염 부분에 부착한 후에는 몇초간 그대로 누르고 있다가 약이 부착된 것을 확인한 후 손가락을 떼십시오. 약을 제대로 부착시키기 위해 잠시 동안 약을 혀 등으로 만지지 않도록 주의하십시오. 약은 바르고 잠시 있으면 젤리 상태가 되어 점점 사라집니다.</p>
제조 판매 회사	사토제약주식회사 도쿄도 미나토구 모토아카사카 1-5-27
투약 형태	정제
의약품 구분	일반 의약품
버전 번호	F

부작용 피해 구제 제도의 문의처	(독)의약품 의료기기 종합 기구 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 전화 0120-149-931(프리 다이얼)
다국어 제품 정보에 대한 고지 사항	◆ 다국어 제품 정보는, 그 제품의 첨부 문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. ◆ 그 기재 내용 및 그 제품 자체가 일본국 이외의 법규에 적합하는 것을 보증하지 않습니다.