

風險類別	指定第2類藥品
藥效學分類	口內炎用藥
產品名稱	アフタッチA AFTACH A
產品功能	<ul style="list-style-type: none"> ●是“貼式”口內炎治療藥。確實的保護口內炎、針對患部緩緩釋放藥效成份。 ●藥物貼附後暫時呈現果凍狀、漸漸的自然溶化後消失。
使用上的注意事項	<p>■禁止事項 (若不遵守、現在的症狀會惡化、或者容易引發副作用)</p> <p>1. 下列的人請勿使用</p> <p>(1) 懷疑為感染性疾病的口腔炎患者。(請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 用紗布等擦拭後可輕易剝落的白斑擴散到口腔整體的人。(懷疑為念珠菌感染性疾病) · 患部有黃膿的人。(懷疑為細菌感染性疾病) · 口腔內多發米粒大~紅豆大小水皰的患者、口腔黏膜以外的口唇、皮膚處也有水皰、起疹的患者。(懷疑為病毒感染性疾病) · 出現發熱、食欲不振、全身倦怠感、淋巴結腫脹等全身症狀者。(懷疑為病毒感染性疾病) <p>(2) 伴隨口腔內感染的人。(由於有因使用類固醇製劑而導致感染性病情惡化的報告、故請勿用於有牙槽膿腫、牙周炎等口腔記憶體在感染的部位。)</p> <p>(3) 即使使用5天也不見症狀改善的人。</p> <p>(4) 即使使用1~2天仍見症狀惡化的人。</p> <p>■諮詢事項</p> <p>1. 下列的人於使用前、請諮詢醫師、牙醫、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>(1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。</p> <p>(2) 曾因藥品等、引發過敏症狀的人。</p> <p>(3) 孕婦或可能懷孕的人。</p> <p>(4) 正在哺乳的人。</p> <p>(5) 患部範圍過大(本藥劑無法完全覆蓋患部)的患者。</p> <p>(6) 年長者。</p> <p>2. 使用後、出現下列症狀的情況下、有可能是副作用、請立刻停止使用、攜帶此文件、諮詢醫師、牙醫、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>關係部分：病徵</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 口腔內：白斑(疑似念珠菌感染)、患部出現黃色膿液(疑似細菌感染症狀)、味覺異常、麻痺 ○ 其他：過敏症狀(發疹、發紅、發癢、浮腫等) <p>3. 使用本藥劑後、若出現下列症狀、則懷疑存在因感染性炎症所致的口腔炎或其他疾病所致的口腔炎、故請停止使用、並諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者。</p> <ul style="list-style-type: none"> 發熱、食欲不振、全身倦怠感、淋巴結腫脹、水皰(除口腔內以外)、發疹、發紅、發癢、本藥劑無法覆蓋的大範圍口腔內患部、眼睛痛、視力模糊、外陰部潰瘍
療效或效果	口腔潰瘍(口瘡)
用法及用量	<p>按下述次數對每個患部進行黏貼使用。</p> <p>[年齡：1天服用次數]</p> <p>成人(15歲以上) / 兒童(5歲以上)對每個患部、1次1片、1天1~2次將白色面朝向患部黏膜黏貼後使用</p>
用法及用量相關的注意事項	<p>[1] 請嚴格遵守規定的用法、用量。</p> <p>[2] 由於本藥劑經一定時間後會自然溶解除去、故請勿勉強將其揭下。</p> <p>[3] 疼痛治癒後請停止使用。(已使用中的藥物無須揭下。)</p> <p>[4] 使兒童使用的情况下、請在家長的指導監督下使其使用。</p> <p>[5] 請勿用於不滿5歲的嬰幼兒。</p> <p>[6] 用於兒童時、黏貼後可能會被其手指揭下、故請多加注意。</p> <p>[7] 本藥劑為口腔黏膜貼劑、故請勿內服。內服也不會有效果。</p> <p>[8] 若出現誤吞、請重新在患部黏貼藥物。萬一症狀發生變化或感到不安、請諮詢醫師、口腔醫師、藥劑師或登錄販賣者。</p> <p>[9] 本藥劑使用方法錯誤時可能出現無法牢固黏貼的情況、故請仔細閱讀使用方法並正確使用。由於有些使用部位可能會難以黏貼、當無法良好地黏貼時請諮詢醫師、口腔醫師、藥劑師或登錄販賣者。</p> <p>[10] 忘記使用時、請在想起後儘早黏貼。</p> <p>[11] 唾液潤濕本藥劑白色面後會使本藥劑黏貼效果變差、此時可用紙巾或紗布等在口腔炎的部位輕輕按壓、擦去唾液後重新黏貼藥品。</p> <p>[12] 將本藥劑黏貼在患部黏膜後、若以舌頭等用力舔舐、可能會導致其脫落、故請予以注意。</p> <p>[13] 藥錠取出方法</p> <p>請用指尖用力按下裝有片劑的PTP藥用鋁箔包裝的凸部、使其背面鋁箔破裂、取出片劑服用。(若不連同鋁箔一同吞下、可能會造成刺傷食道黏膜等不可預期的事故。)</p>
成分及分量	每1片中 曲安奈德：0.025mg；鎮定患部發炎症狀、改善口內炎。
添加劑	羥丙基纖維素、聚羧乙烯、硬脂酸鎂、乳糖、羧甲基纖維素鈣、滑石、矽酸鎂鋁、黃色5號
保管及使用上的注意事項	<p>[1] 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。</p> <p>[2] 从PTP板中取出本藥品后請尽快使用。</p> <p>[3] 請保管於兒童拿不到的地方。</p> <p>[4] 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質)。</p> <p>[5] 請勿使用超過有效期限的產品。</p>
客戶服務台	<p>有關此產品的諮詢、請聯絡您購買的商店或以下方式：</p> <p>客戶服務中心[佐藤製藥有限公司]</p> <p>電話：03-5412-7393 接待時間：9：00-17：00(週六、週日及假日除外)</p> <p>電話諮詢僅提供日語服務。</p>
如何使用AFTACH_A	<p>[1] 本藥物針對的「口內炎(口瘡性)」、是指在臉頰內側、舌或唇內側等有1~數個周圍泛紅且中央部份淺淺空心的白色圓圈的小潰瘍(直徑10mm以下)引起的發炎症狀的總稱。</p> <p>[2] 以面紙或紗布輕輕按壓口腔內發炎的部份、將唾液擦拭乾淨(貼附本藥劑的範圍若有唾液的話、可能會使藥物無法確實附著。)</p> <p>[3] 指尖沾取少量唾液、再以指尖於本藥劑橘色面上輕按、使藥劑附著。</p> <p>[4] 一面照鏡子、一面將白色面(含有主要成份)朝口內炎的部份小心的貼上。白色面若被唾液等沾溼的話、就無法確實的附著在患部上、因此、若無法黏貼時請再取一份新的藥劑重新貼附。</p> <p>[5] 下列的部位、尤其是藥劑很難黏貼的部位、請以棉花棒代替指尖進類黏貼的動作。</p> <p>舌頭內側、牙齦等表面凹凸不平的部份、若無法黏貼時請向醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄經銷商諮詢。</p> <p>[6] 藥劑貼附於口內炎的部位後、請按壓數秒鐘、確認藥劑已附著後手指即可放開。為使藥劑能確實附著、暫時勿以舌頭等接觸藥劑、請您留意。藥物貼附後暫時呈現果凍狀、漸漸的自然溶化後消失。</p>
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂1丁目5番27號
劑型	藥片
藥品類別	一般用醫藥類
版本號	F

不良反應救濟系統的 聯絡方式	藥品及醫療器材管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話：0120-149-931(免付費)
多語種產品信息的免 責聲明	<ul style="list-style-type: none">◆ 多語言產品資訊是產品說明書的翻譯、僅供參考。◆ 我們不保證本產品的內容或產品本身符合日本以外的法規。