风险类别	第1类药品
药效分类	抗病毒药
产品名称	アラセナSクリーム　ARASENA S CREAM
产品特点	● 口唇疱疹复发治疗药、含抗疱疹病毒成分阿糖腺苷。 ● 当口唇及其周围有火辣、刺痛等不适感觉时、建议立即涂抹。
使用注意事项	■ 禁止事项 (若不遵守则会导致当前病情恶化、或容易出现副作用及事故) 1. 下述人群不要使用 (1) 未接受过医生对口唇疱疹的诊断和治疗的人群。(未接受过医生对口唇疱疹的诊断的人群、自己难以判断且首次发病时可能症状加重、因此请接受医生诊治。) (2) 患部范围过大的患者。(患部范围过大则为重症、请接受医生诊治。) (3) 因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。(使用本药剂可能会引起二次过敏症状。) (4) 未满6岁的婴幼儿。(婴幼儿很可能是首次感染。) (5) 有发热、大范围发疹等全身症状的人群。(有发热、大范围发疹等全身症状时、症状可能会加重、请接受医生诊治。) 2. 请勿用于口唇及口唇周围以外的部位。 (口唇疱疹是出现于口唇及其周围。) 3. 不要长期连续服用 (使用本药剂后即使症状有所缓解、但如果治疗时间超过2周、则可能为重症或其他疾病。) ■ 咨询事项 1. 以下人群在使用前请咨询医生或药剂师。 (1) 正在接受医师治疗的人群(可能会影响医生开的药、或者已经在使用与本片剂相同的药物。) (2) 孕妇或有其可能性的人群(用药需谨慎、必须咨询专业医生并遵医嘱。) (3) 哺乳期人群(与本药剂相同的成分注射入动物体内后、确认了会转移到乳汁中。) (4) 因药物等出现过过敏症状的人群(因药物等出现过过敏症状的人群、也可能会因为本片剂而出现过敏。) (5) 湿润或糜烂较为严重的人群。(可能为重度口唇疱疹或其他疾病、必须咨询专业医生并遵医嘱。) (6) 过敏性皮炎人群。(症状可能会加重、必须咨询专业医生并遵医嘱。) 2. 使用后若出现下述症状、则可能存在副作用、此时应立即中止服用、并携带本说明书咨询医师或药剂师 关系部分：病征 ○ 皮肤：起疹、发红、红肿、发痒、斑疹、刺激感 (也许是因为本药剂引起的过敏症状或本药剂的刺激、此时若继续使用、可能导致症状进一步恶化。) 3. 如果使用 5 天后症状没有改善或恶化、请停止使用并咨询您的医生或药剂师、并参考本说明书。 (使用5天症状无缓解、则可能是重症或其他疾病、请尽快咨询医生或药剂师。)
效能或效果	口唇疱疹复发(仅限之前接受过医生诊断和治疗的人群)
用法及用量	1天1～4次、取适量涂抹于患处。 (当口唇及其周围有火辣、刺痛等不适感觉时、立即涂抹。) ● 早用早好、且可避免症状加重、因此有火辣、刺痛等不适感觉时、请尽快(5天以内)开始使用。 ● 使用时间建议为每次用餐后、就寝前。
用法及用量相关注意	[1] 请严格遵守规定的用法・用量使用。 [2] 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。 [3] 注意不要入眼。不慎入眼时立即用冷水或温水进行清洗。症状严重时应前往眼科就诊。 [4] 仅限外用。 [5] 请勿放入口中或舔舐。 [6] 请充分留意、防止首次发病的家人误用。
成分及分量	每1ｇ中 阿糖腺苷：30㎎：抑制疱疹病毒增殖。
添加剂	硬脂酸、棕榈酸、鲸蜡醇、自乳化型甘油硬脂酸、甘油、D-山梨醇、氢氧化钠、氢氧化钾、对羟基本甲酸酯、三种其他成分
保管及使用注意事项	[1] 请密封保存于阴凉干燥处、温度低于30℃、避免阳光直射。 [2] 保管在儿童无法触及的地方。 [3] 使用前后、请仔细清洁双手。 [4] 不要移至其他容器中(会导致误用或变质)。 [5] 请勿使用 超过有效期的产品。 另外、即使是有效期内、也请在开封后6个月以内使用。
客户服务台	有关此产品的咨询、请联系您购买的商店或以下方式： 客户服务中心[佐藤制药有限公司] 电话：03-5412-7393 接待时间：9：00-17：00(周六、周日及节假日除外) 电话咨询仅提供日语服务。
生产销售公司	佐藤制药有限公司 东京都港区元赤坂1丁目5番27号
剂型	外用制剂
药品类别	一般用医药品
版本号	A
不良反应救济系统的联系方式	药品和医疗器械管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 电话：0120-149-931(免费)
多语种产品信息的免责声明	◆ 多语言产品信息是产品说明书的翻译、仅供参考。 ◆ 我们不保证本产品的内容或产品本身符合日本以外的法律法规。