風險類別	第1類藥品
藥效學分類	抗病毒藥
產品名稱	アラセナSクリーム　ARASENA S CREAM
產品功能	● 口唇皰疹復發治療藥、含抗皰疹病毒成分阿糖腺苷。 ● 當口唇及其周圍有火辣、刺痛等不適感覺時、建議立即塗抹。
使用上的注意事項	■ 禁止事項 (若不遵守、現在的症狀會惡化、或者容易引發副作用・意外) 1. 下列的人請勿使用 (1) 未接受過醫師對口唇皰疹的診斷和治療的人。(未接受過醫師對口唇皰疹的診斷的人、自己難以判斷且首次發病時可能症狀加重、因此請接受醫師診治。) (2) 患部範圍過大的患者。(患部範圍過大則為重症、請接受醫師診治。) (3) 曾因本藥劑或本藥劑的成分、引發過敏症狀的人。(使用本藥劑可能會引起二次過敏症狀。) (4) 未滿6歲的嬰兒、兒童。(嬰幼兒很可能是首次感染。) (5) 有發熱、大範圍發疹等全身症狀的人。(有發熱、大範圍發疹等全身症狀時、症狀可能會加重、請接受醫師診治。) 2. 請勿用於口唇及口唇周圍以外的部位。 (口唇皰疹是出現於口唇及其周圍。) 3. 請勿長期連續服用 (使用本藥劑後即使症狀有所緩解、但如果治療時間超過2周、則可能為重症或其他疾病。) ■ 諮詢事項 1. 以下人員在使用前請諮詢醫師或藥劑師。 (1) 正在接受醫師治療的人。(可能會影響醫師開的藥、或者已經在使用與本片劑相同的藥物。) (2) 孕婦或可能懷孕的人。(用藥需謹慎、必須諮詢專業醫師並遵醫囑。) (3) 正在哺乳的人。(與本藥劑相同的成分注射入動物體內後、確認了會轉移到乳汁中。) (4) 曾因藥品等、引發過敏症狀的人。(曾因藥物等引發過敏症狀的人、也可能會因為本片劑而引發過敏。) (5) 浸潤和潰爛嚴重的人。(可能為重度口唇皰疹或其他疾病、必須諮詢專業醫師並遵醫囑。) (6) 過敏性皮炎的人。(症狀可能會加重、必須諮詢專業醫師並遵醫囑。) 2. 使用後、出現下列症狀的情況下、有可能是副作用、請立刻停止服用、攜帶此文件、詢諮醫師或藥劑師 關係部分：病徵 ○ 皮膚：發疹、發紅、腫脹、發癢、斑疹、刺激感 (也許是因為本藥劑引起的過敏症狀或本藥劑的刺激、此時若繼續使用、可能導致症狀進一步惡化。) 3. 如果使用 5 天後症狀沒有改善或惡化、請停止使用並諮詢您的醫生或藥劑師、並參考本說明書。 (使用5天症狀無緩解、則可能是重症或其他疾病、請儘快諮詢醫師或藥劑師。)
療效或效果	口唇皰疹復發(僅限之前接受過醫師診斷和治療的人)
用法及用量	1天1～4次、塗抹適量於患部。 (當口唇及其周圍有火辣、刺痛等不適感覺時、立即塗抹。) ● 早用早好、且可避免症狀加重、因此有火辣、刺痛等不適感覺時、請儘快(5天以內)開始使用。 ● 使用時間建議為每次用餐後、就寢前。
用法及用量相關的注意事項	[1] 請嚴格遵守規定的用法・用量。 [2] 使兒童使用的情況下、請在家長的指導監督下使其使用。 [3] 請注意、不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下、請馬上以水或溫水沖洗。此外、症狀嚴重的情況下、請接受眼科醫師的診療。 [4] 請只使用於外用。 [5] 請勿放入口中或舔舐。 [6] 請充分留意、防止首次發病的家人誤用。
成分及分量	1ｇ中 阿糖腺苷：30㎎：抑制皰疹病毒增殖。
添加劑	硬脂酸、棕櫚酸、鯨蠟醇、自乳化型甘油硬脂酸、甘油、D-山梨醇、氫氧化鈉、氫氧化鉀、對羥基本甲酸酯、三種其他成分
保管及使用上的注意事項	[1] 請密封保存於陰涼乾燥處、溫度低於30℃、避免陽光直射。 [2] 請保管於兒童拿不到的地方。 [3] 使用前後、請仔細清潔雙手。 [4] 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質)。 [5] 請勿使用超過有效期限的產品。 另外、即使是有效期內、也請在開封後6個月以內使用。
客戶服務台	有關此產品的諮詢、請聯絡您購買的商店或以下方式： 客戶服務中心[佐藤製藥有限公司] 電話：03-5412-7393 接待時間：9：00-17：00(週六、週日及假日除外) 電話諮詢僅提供日語服務。
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂1丁目5番27號
劑型	外用製劑
藥品類別	一般用醫藥類
版本號	A
不良反應救濟系統的聯絡方式	藥品及醫療器材管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話：0120-149-931(免付費)
多語種產品信息的免責聲明	◆ 多語言產品資訊是產品說明書的翻譯、僅供參考。 ◆ 我們不保證本產品的內容或產品本身符合日本以外的法規。