

위험수준 구분	지정 제2류 의약품
약효 분류	감기약
제품 이름	스토나제이엘사이나스EX STONA GEL SINUS EX
제품의 특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 감기의 콧물을 뛰어난 효과를 나타내는 벨라 총 알칼로이드, 페닐 피라린 염산염을 배합 한 감기약입니다.</li> <li>● 아세트아미노펜의 효과로 열을 내려 주고 두통 등의 통증을 완화해 줍니다.</li> <li>● 마시기 좋은 소프트 캡슐에서 내용물을 액상으로 만들어지고 있습니다.</li> </ul>
사용상의 주의	<p>■ 해서는 안 되는 것 (지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용/사고가 일어나기 쉽다)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 다음에 해당하는 사람은 복용하지 말 것             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 본제 또는 본제 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 분.</li> <li>(2) 본제 또는 다른 해열 진통제, 감기약을 복용하여 천식을 일으킨 적이 있는 사람.</li> <li>(3) 15세 미만의 소아.</li> </ol> </li> <li>2. 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것 다른 감기약, 해열 진통제, 진정제, 진해 거담제, 항히스타민제를 함유하는 내복약 등(비염용 내복약, 멀미약, 알레르기용 약 등), 위장 진통 진경제</li> <li>3. 복용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 않을 것(졸음과 눈 침침함, 비정상적인 눈부심 등의 증상이 나타날 수 있다.)</li> <li>4. 수유 중인 사람은 본제를 복용하지 않으며, 본제를 복용할 경우에는 수유를 피할 것</li> <li>5. 복용 전후에 음주하지 않을 것</li> <li>6. 장기간 연용하지 않을 것</li> </ol> <p>■ 상담할 내용 1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.</li> <li>(2) 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.</li> <li>(3) 고령자.</li> <li>(4) 약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.</li> <li>(5) 다음의 증상이 있는 사람. 고열, 배뇨 곤란</li> <li>(6) 다음의 진단을 받은 사람. 갑상선 기능 장애, 당뇨병, 고혈압, 심장병, 간장병, 신장병, 위·십이지장 궤양, 녹내장, 호흡기장애, 폐쇄성 수면무호흡증후군, 비만증</li> </ol> <p>2. 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성에 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것</p> <p>관계부위: 증상</p> <p>○ 피부: 발진/발적, 가려움</p> <p>○ 소화기: 메스꺼움·구토, 식욕 부진, 위부 불쾌감, 위통, 복통, 복부와 복부의 충만, 속쓰림, 설사</p> <p>○ 정신신경계: 현기증, 두통, 마비</p> <p>○ 비뇨기: 배뇨 곤란</p> <p>○ 기타: 과도한 체온 저하, 얼굴 홍조, 비정상적인 눈부심, 부종</p> <p>드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.</p> <p>증상의 명칭: 증상</p> <p>○ 쇼크(アナフィラクシス): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉰소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.</p> <p>○ 피부 절막인 증후군 (스티븐스-존슨 증후군): 중독성 표피 괴사 용해증, 급성 범발성 발진성 농포증: 고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적, 빨개진 피부에 작고 도돌한 것 (작은 농포) 이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.</p> <p>○ 약제성 과민증 증후군: 피부가 넓은 범위로 빨개진다, 전신성 발진, 발열, 몸이 나른하다, 림파절(목, 겨드랑이 밑, 가량이 등)의 부종 등이 나타난다.</p> <p>○ 간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 활달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.</p> <p>○ 간질성 폐렴: 계단을 오를 때나 과로할 때 숨이 차거나 숨쉬기가 어려우며, 갑작스러운 건조한 기침과/또는 발열 및 지속적인 증상.</p> <p>○ 천식: 숨을 쉴 때 색색, 흉내, 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.</p> <p>○ 호흡억제: 숨이 차, 호흡 곤란 등이 나타남.</p> <p>3. 복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.</p> <p>변비, 입마름, 출음, 눈 침침함</p> <p>4. 5 ~ 6 회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중지하고 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록 판매자에 문의하십시오</p> </p>
효능 또는 효과	감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화
용법 및 용량	<p>아래의 1회 복용량을 식후 가급적 30분 이내에 복용합니다.</p> <p>[연령: 1회 복용량: 1일 복용횟수] 성인 (15세 이상): 2캡슐: 3회 15세 미만: 복용하지 마십시오</p>
용법 및 용량에 관한 주의	<p>[1] 정해진 용법·용량을 준수해 주십시오.</p> <p>[2] 캡슐 꺼내는 방법 캡슐이 들어 있는 PTP 시트의 돌출된 부분을 손가락으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일을 찢어 꺼낸 후 복용하십시오. (실수로 그대로 삼키거나 하면 식도 점막에 꽂히는 등 예상치 못한 사고로 연결됩니다.)</p>
성분 및 분량	<p>6 캡슐 중 벨라돈나 총알카로이드: 0.6mg: 부교감 신경에 작용해 콧물을 억제합니다. 디페닐피라린 염산염: 4mg: 콧물, 코막힘, 재채기 등의 증상을 억제합니다. 아세트아미노펜: 900mg: 발열, 오한, 두통, 인후통, 마디마디의 통증에 효과를 나타냅니다. dL-메틸로페드린염산염: 60mg: 발열, 오한, 두통, 인후통, 마디마디의 통증에 효과를 나타냅니다. 디히드로로코데인산염: 24mg: 발열, 오한, 두통, 인후통, 마디마디의 통증에 효과를 나타냅니다. 노스카핀: 48mg: 발열, 오한, 두통, 인후통, 마디마디의 통증에 효과를 나타냅니다. 앰브로신: 45mg: 가래를 쉽게 배출. 무수카페인: 75mg: 발열, 진통, 성분의 작용을 높여 줍니다. 리보플라빈: 12mg: 감기 때 소모하기 쉬운 비타민입니다.</p>
성분 및 분량에 관한 주의	● 본제에는 비타민B2인산에스테르나트륨이 함유되어 있어 본제의 복용으로 인해 소변이 황색으로 변할 수 있습니다.
첨가물	라 우릴 황산 Na, 폴리 소르 베이트 80, 프로필렌 글리콜 지방산 에스테르, 글리세린 지방산 에스테르, 젤라틴, 호박 화 젤라틴, 글리세린, D- 소르비톨, 산화 티탄, 파라벤
보관 및 취급상의 주의	<p>[1] 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.</p> <p>[2] 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</p> <p>[3] 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 염려가 있습니다).</p> <p>[4] 사용 기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.</p>
고객 서비스 데스크	본제품에 관한 문의는, 매입의 가게 또는 하기의 부탁 말씀드립니다. 고객 상담 창구[사토제약주식회사] 전화 03-5412-7393 접수 시간 9:00~17:00 (토, 일, 공휴일 제외) 전화로의 문의는 일본어만이 됩니다.
제조 판매 회사	사토제약주식회사 도쿄도 미나토구 모토아카사카 1-5-27

투약 형태	캡슐
의약품 구분	일반 의약품
버전 번호	3
부작용 피해 구제 제도의 문의처	(독)의약품 의료기기 종합 기구 <a href="https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html">https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html</a> 전화 0120-149-931(프리 다이얼)
다국어 제품 정보에 대한 고지 사항	<p>◆ 다국어 제품 정보는, 그 제품의 첨부 문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다.</p> <p>◆ 그 기재 내용 및 그 제품 자체가 일본국 이외의 법규에 적합하는 것을 보증하지 않습니다.</p>