

風險類別	指定第2類藥品
藥效學分類	感冒藥
產品名稱	ストナジェルサイナスEX STONA GEL SINUS EX
產品功能	<p>● 這是一種感冒藥、其中含有蕁茄總生物鹼、鹽酸二苯基吡喃啉、對感冒的流鼻涕有極好的效果。</p> <p>● 對乙酰氨基酚具有退燒、緩和頭痛等疼痛之效。</p> <p>● 易於使用的軟膠囊、內容物是液體。</p>
使用上的注意事項	<p>■ 禁止事項</p> <p>(若不遵守、現在的症狀會惡化、或者容易引發副作用・意外)</p> <p>1. 下列的人請勿服用</p> <p>(1) 曾因本藥劑或本藥劑的成份引起過敏症狀的人。</p> <p>(2) 曾服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥、引發氣喘的人。</p> <p>(3) 未滿15歲的兒童。</p> <p>2. 服用本藥劑的期間、請勿服用下列任何一種醫藥品。</p> <p>其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等(鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等)、胃腸鎮痛鎮痙藥</p> <p>3. 服用後、請勿駕駛操作交通工具或機械類(可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。)</p> <p>4. 正在哺乳的人請勿服用本藥劑、或者服用本藥劑的情況下、請避免哺乳</p> <p>5. 服用前後、請勿飲酒</p> <p>6. 請勿長期連續服用</p> <p>■ 諮詢事項</p> <p>1. 下列的人於服用前、請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>(1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。</p> <p>(2) 孕婦或可能懷孕的人。</p> <p>(3) 年長者。</p> <p>(4) 曾因藥品等、引發過敏症狀的人。</p> <p>(5) 有下列症狀的人。</p> <p>發高燒、排尿困難</p> <p>(6) 接受過下列診斷的人。</p> <p>甲狀腺功能障礙、糖尿病、心臟病、高血壓、肝臟病、腎臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、青光眼、呼吸功能障礙、阻塞性睡眠呼吸中止症、肥胖症</p> <p>2. 服用後、出現下列症狀的情況下、有可能是副作用、請立刻停止服用、攜帶此文件、諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>關係部分：病徵</p> <p>○ 皮膚：發疹・發紅、發癢</p> <p>○ 消化器官：噁心、嘔吐、食欲不振、胃部不適感、胃痛、腹痛、胃和腹部豐滿、胸口灼熱、腹瀉</p> <p>○ 精神神經系統：頭暈、頭痛、麻木</p> <p>○ 泌尿器官：排尿困難</p> <p>○ 其他：過度的體溫低下、臉發燙、異常目眩、浮腫</p> <p>極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下、請立刻接受醫師的診療。</p> <p>症狀名稱：症狀</p> <p>○ 休克(過敏性)：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。</p> <p>○ 史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小膿疱、全身倦怠、沒有食欲等持續、或者突然惡化。</p> <p>○ 藥物過敏症候群：皮膚廣泛性發紅、出現全身發疹、發燒、倦怠感、淋巴結(頸部、腋下、腹股溝等)腫大等。</p> <p>○ 肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。</p> <p>○ 腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。</p> <p>○ 間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體、就會突然出現氣短呼吸困難、乾咳、發燒等、或者持續這些症狀。</p> <p>○ 氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲、出現呼吸困難等。</p> <p>○ 呼吸抑制：出現呼吸急促、呼吸困難等。</p> <p>3. 服用後、可能出現下列症狀、這種症狀持續或變嚴重的情況下、請停止服用、攜帶此文件、諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>便秘、口乾、嗜睡、視力模糊</p> <p>4. 如果服用5到6次後症狀仍未改善、請停止使用並與醫生、藥劑師或註冊賣家一起使用本文檔。</p>
療效或效果	緩和感冒的各項症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、咳嗽、生痰、惡寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉疼痛)
用法及用量	<p>請盡量在飯後30分鐘以內、服用下述的1次服用量。</p> <p>[年齡：1次服用量：1天服用次數]</p> <p>成人(15歲以上)：2粒：3次</p> <p>未滿15周歲：請勿服用</p>
用法及用量相關的注意事項	<p>[1] 請嚴格遵守規定的用法・用量。</p> <p>[2] 膠囊取出方式</p> <p>將包覆錠劑的PTP凸起部分以指腹向下擠壓、內部鋁箔破開後取出藥劑服用。(若不小心誤食可能造成刺穿食道黏膜等意外事故。)</p>
成分及分量	<p>每6膠囊</p> <p>蕁茄總生物鹼：0.6mg：有效控制副交感神經、可抑制鼻水。</p> <p>鹽酸二苯基吡拉林：4mg：可緩解流鼻水、鼻塞、打噴嚏等症狀。</p> <p>對乙酰氨基酚：900mg：對發燒、畏寒、頭痛、喉嚨痛、全身酸痛有效。</p> <p>dl-鹽酸甲基麻黃鹼：60mg：緩解咳嗽症狀。</p> <p>雙氫可待因磷酸鹽：24mg：緩解咳嗽症狀。</p> <p>諾斯卡品：48mg：緩解咳嗽症狀。</p> <p>鹽酸氨溴索：45mg：輕鬆排出痰液。</p> <p>無水咖啡因：75mg：可提高解熱、鎮痛成分的效果。</p> <p>核黃素：12mg：補充感冒時容易缺乏的維生素。</p>
成分及分量相關的注意事項	● 由於本藥劑含有維生素B2磷酸鹽、因此服用本劑時尿液會呈現偏黃色。
添加劑	十二烷基硫酸鈉、聚山梨醇酯80、丙二醇脂肪酸酯、甘油脂肪酸酯、明膠、琥珀酸明膠、甘油、D-山梨糖醇、氧化鈦、對羥基苯甲酸酯
保管及使用上的注意事項	<p>[1] 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。</p> <p>[2] 請保管於兒童拿不到的地方。</p> <p>[3] 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質)。</p> <p>[4] 請勿使用超過有效期限的產品。</p>
客戶服務台	<p>有關此產品的諮詢、請聯絡您購買的商店或以下方式：</p> <p>客戶服務中心[佐藤製藥有限公司]</p> <p>電話：03-5412-7393 接待時間：9：00-17：00(週六、週日及假日除外)</p> <p>電話諮詢僅提供日語服務。</p>
生產銷售公司	<p>佐藤製藥有限公司</p> <p>東京都港區元赤坂1丁目5番27號</p>

劑型	膠囊
藥品類別	一般用醫藥類
版本號	3
不良反應救濟系統的 聯絡方式	藥品及醫療器材管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話：0120-149-931(免付費)
多語種產品信息的免 責聲明	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 多語言產品資訊是產品說明書的翻譯、僅供參考。 ◆ 我們不保證本產品的內容或產品本身符合日本以外的法規。