위험수준 구분	지정 제2류 의약품
약효 분류	해열 진통제
제품 이름	リングルアイビーα200 RINGL IBα200
제품의 특징	● 두통, 생리통 등의 통증에 효과를 나타내는 이부프로펜이 배합된 젤 캡슐입니다. ● 유효성분인 이부프로펜이 액체 상태로 녹아 있습니다.
사용상의 주의	■ 해서는 안 되는 것 (지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용/사고가 일어나기 쉽다) 1. 다음에 해당하는 사람은 복용하지 말 것 (1) 본제 또는 본제 성분에 의해 알레르기 증상 을 일으킨 적이 있는 분. (2) 본제 또는 다른 감기약을 , 해열 진통제 복용하여 천식을 일으킨 적이 있는 사람. (천식을 유발할 가능성이 있습니다.) (3) 15세 미만의 소아. (4) 의료기관에서 다음 질병의 치료와 의약품의 투여를 받고있는 사람. 위, 십이지장 궤양, 혈액 관련 질병, 간장병, 신장병, 심장병, 고혈압, 지도부딘 (레트로비르)를 투여 중인 분. (위, 십이지장 궤양, 간장병, 신장병을 앓고 있는 분은 그 증상이 악화될 가능성이 있습니다) (혈액 관련 질병을 앓고 있는 분은 백혈구 감소, 혈소판 감소 등을 일으킬 수 있으며, 그 증상을 보다 악화시킬 가능성이 있습니다. (심장병을 앓고 있는 분은 심부전이 보다 악화될 가능성이 있습니다) (고혈압을 앓고 있는 분은 혈압이 보다 상승할 가능성이 있습니다) (5) 출산 예정일 12주 이내의 임산부. 2. 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것 다른 해열 진통제, 감기약, 진정제 3. 복용 전후에 음주하지 않을 것 (일반적으로 알코올은 약의 흡수와 대사를 촉진시키고 부작용의 발현이나 독성을 증강시킬 수 있어 위중한 간의 장애가 나타날 수 있습니다.) 4. 장기간 연용하지 않을 것 ■ 상담할 내용 1. 다음 사람은 복용전에 의 의사, 치과 의사, 약사 또는 등록 판매자에게 상담하십시오. (1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람. (2) 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람. (3) 수유 중인 사람. (4) 고령자. (일반적으로 고령자는 생리 기능이 저하되어 있기 때문에 강한 부작용이 나타날 수 있습니다.) (5) 약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람. (6) 다음의 진단을받은 사람 또는 질병에 걸린 적이있는 사람. 위, 십이지장 궤양, 혈액 관련 질병, 간장병, 신장병, 심장병, 고혈압, 기관지 천식 (기관지 천식을 유발할 수 있습니다), 전신성 에리테마토데스 (신장 장애 등 이 병의 증상이 악화되거나, 무균성 뇌막염이 나타날 수 있습니다), 혼합성 결합 조직병 (무균성 뇌막염이 나타날 수 있습니다), 궤양성 대장염, 크론병 (증상이 악화됐다는 보고가 있습니다) 2. 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사,약사 또는 등록판매자와 상담할 것 관계부위: 증상 ○ 피부: 발진/발적, 가려움, 푸른 멍 ○ 소화기: 메스꺼움/구토, 식욕 부진, 위통,위부 불쾌감, 구내염,속쓰림,더부룩함, 위장 출혈, 복통, 설사, 혈변 ○ 정신 신경계: 현기증, 졸음, 불면증, 기분이 막는다 ○ 순환기: 두근거림 ○ 호흡기: 숨이 참 ○ 기타: 눈 침침함,이명,붓기,코피,잇몸 출혈, 출혈이 멈추지 않는 증상,출혈 ,등 통증,과도한 체온 저하, 나른함 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것. 증상의 명칭: 증상 ○ 쇼크(아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉰소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다. ○ 피부 점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 융해증: 고열, 눈의 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적 등이 지속되거나 급격히 악화된다. ○ 소화기 장애: 운항 검게, 토혈, 혈변, 점액 혈변 (혈액/점액/고름이 섞인 부드러운 항공편) 등이 나타난다. ○ 간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다. ○ 신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통(마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다. ○ 무균성 뇌막염: 목덜미가 당기는 심한 두통, 발열, 메스꺼움·구토 등이 나타난다. (이러한 증상은 특히 전신성 홍반성 낭창 또는 혼합성 결합 조직 질환의 치료를 받고 있는 사람에게서 많이 보고되고 있다.) ○ 심근 경색: 끈적 끈적한 가슴 통증, 답답한, 차가운 땀이 나옵니다. ○ 뇌혈관 장애: 의식 저하/의식 상실, 단측 사지 움직임 곤란, 두통, 구토, 현기증, 말하기 곤란, 언어 실어증 등의 증상이 갑자기 나타날 수 있습니다. ○ 천식: 숨을 쉴 때 색색, 휙휙과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다. ○ 재생 불량성 빈혈: 푸른 멍, 코피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보임, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어질해짐, 혈뇨 등이 나타난다. ○ 무과립구증: 갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다. 3. 복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것. 변비,입마름 4. 복용후, 체온이 평상시 체온보다 낮다. 힘이 나지 않음(허탈), 손발이 차가워짐(사지냉각) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 그 경우에는 즉시 복용을 중지하고 담요 등으로 보온한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담해 주십시오. 5. 3~4회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것
효능 또는 효과	[1] 두통·치통·발치 후 동통·인후통·이통·관절통·신경통·요통·근육통·어깨 결림통·타박통· 골절통·염좌통·월경통(생리통)·외상 통의 진통 [2] 오한·발열 시의 해열
용법 및 용량	증상이 나타났을 경우, 아래의 1회 복용량을 가급적 공복시를 피해 복용합니다. 복용 간격은 4시간 이상으로 하여 주십시오. [연령: 1회 복용량: 1일 복용횟수] 성인 (15세 이상): 1캡슐:2 회를 한도로합니다.(단, 증상이 다시 나타난 경우에는 3회째를 복용할 수 있습니다) 15세 미만: 복용하지 마십시오
용법 및 용량에 관한 주의	[1] 정해진 용법·용량을 준수해 주십시오. [2] 캡슐 꺼내는 방법 캡슐이 들어 있는 PTP 시트의 돌출된 부분을 손가락으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일을 찢어 꺼낸 후 복용하십시오.(실수로 그대로 삼키거나 하면 식도 점막에 꽂히는 등 예상치 못한 사고로 연결됩니다.)
성분 및 분량	1 캡슐 중 이부프로펜:200mg:두통, 생리통, 치통 등의 진통. 발열 시의 해열.
첨가물	폴리 소르 베이트 80, 수산화 K, 젤라틴, 호박 화 젤라틴, 옥수수 전분 유래 당 알코올, 치자 색소

보관 및 취급상의 주의	[1] 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. [2] 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. [3] 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 염려가 있습니다). [4] 사용 기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오. [5] 캡슐제는 흡습하기 쉬우므로, 젖은 손 등으로 만지지 않도록 주의해 주십시오.
고객 서비스 데스크	본제품에 관한 문의는, 매입의 가게 또는 하기에 부탁 말씀드립니다. 고객 상담 창구[사토제약주식회사] 전화 03-5412-7393 접수 시간 9:00-17:00 (토, 일, 공휴일 제외) 전화로의 문의는 일본어만이 됩니다.
제조 판매 회사	사토제약주식회사 도쿄도 미나토구 모토아카사카 1-5-27
투약 형태	캡슐
의약품 구분	일반 의약품
버전 번호	6
부작용 피해 구제 제도의 문의처	(독)의약품 의료기기 종합 기구 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 전화 0120-149-931(프리 다이얼)
다국어 제품 정보에 대한 고지 사항	◆ 다국어 제품 정보는, 그 제품의 첨부 문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. ◆ 그 기재 내용 및 그 제품 자체가 일본국 이외의 법규에 적합하는 것을 보증하지 않습니다.