風險類別	指定第2類藥品
藥效學分類	解熱鎮痛藥
產品名稱	リングルアイビーα200　RINGL IBα200
產品功能	● 含有布洛芬的膠狀膠囊、能有效緩解頭痛、生理痛等疼痛或發熱症狀。 ● 布洛芬的有效成份溶於液體中。
使用上的注意事項	■ 禁止事項 (若不遵守、現在的症狀會惡化、或者容易引發副作用・意外) 1. 下列的人請勿服用 (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成份引起過敏症狀的人。 (2) 曾服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥、引發氣喘的人。 (可能引發氣喘) (3) 未滿15歲的兒童。 (4) 在醫療機構接受下列疾病治療或藥物治療的人。 胃潰瘍/十二指腸潰瘍、血液疾病、肝臟病、腎臟病、心臟病、高血壓、服用齊多夫定(立妥威)治療的人。 (患有胃潰瘍/十二指腸潰瘍、肝臟病、腎臟病的人、可能引起該症狀的惡化) (患有有血液疾病的人可能引起白血球減少、血小板減少等、使該症狀更加惡化) (患有心臟病的人、可能使心臟功能障礙更加惡化) (患有高血壓的人、可能使血壓更加上昇) (5) 預产期在12周以內的孕妇。 2. 服用本藥劑的期間、請勿服用下列任何一種醫藥品。 其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥 3. 服用前後、請勿飲酒 (一般而言、酒精能促進藥物吸收或代謝、並可能增加副作用和毒性、因此可能出現嚴重的肝功能損傷。) 4. 請勿長期連續服用 ■ 諮詢事項 1. 以下人群在服用前應諮詢醫生、牙醫、藥劑師或註冊銷售人員 (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。 (2) 孕婦或可能懷孕的人。 (3) 正在哺乳的人。 (4) 年長者。 (一般而言、年長者的生理功能較弱、因此副作用也較強。) (5) 曾因藥品等、引發過敏症狀的人。 (6) 具有以下診斷的人或患有該疾病的人。 胃潰瘍/十二指腸潰瘍、血液疾病、肝臟病、腎臟病、心臟病、高血壓、支氣管哮喘(會誘發支氣管哮喘)、全身性紅斑性狼瘡(可能使腎功能障礙等疾病惡化、或出現無菌性腦膜炎)、混合性結締組織病(可能出現無菌性腦膜炎)、潰瘍性大腸炎、克隆氏症(曾有過使症狀惡化的報告) 2. 服用後、出現下列症狀的情況下、有可能是副作用、請立刻停止服用、攜帶此文件、詢諮醫師、牙醫、藥劑師或登錄販賣者 關係部分：病徵 ○ 皮膚：發疹、發紅、發癢、出現淤青 ○ 消化器官：噁心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不適感、口內炎、胸口灼熱、腹脹、胃腸出血、腹痛、腹瀉、血便 ○ 精神神經系統：頭暈、睏倦、失眠、情緒波動 ○ 循環器官：心悸 ○ 呼吸器官：氣短 ○ 其他：視力模糊、耳鳴、腫脹、流鼻血、牙齦出血、出血不易停止、出血、背痛、過度的體溫低下、身體倦怠 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下、請立刻接受醫師的診療。 症狀名稱：症狀 ○ 休克(過敏性)：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。 ○ 史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹、發紅等持續、或者突然惡化。 ○ 消化系統疾病：糞便發黑、吐血、血便、粘液便(軟便中含有血液、粘液、膿液)等。 ○ 肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。 ○ 腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。 ○ 無菌性腦膜炎：出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心・嘔吐等。(尤其是接受全身性紅斑性狼瘡或混合性結締組織病治療的人當中、許多人自訴這種症狀。) ○ 心肌梗塞：出現胸悶、呼吸困難、出冷汗等症狀。 ○ 腦血管障礙：突然出現意識減退・意識喪失、單側肢體活動困難、頭痛、嘔吐、頭暈、說話困難、言語失用等症狀。 ○ 氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲、出現呼吸困難等。 ○ 再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。 ○ 無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。 3. 服用後、可能出現下列症狀、這種症狀持續或變嚴重的情況下、請停止服用、攜帶此文件、詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者 便祕、口乾 4. 服用後、有可能會出現體溫較平常低、無力(虛脫)、手腳冰冷(四肢冷卻)等症狀。該情況下、請立刻停止服用、並使用毛毯等保暖、攜帶此文件、諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 5. 即使服用3～4次、症狀也沒有改善的情況下、請停止服用、攜帶此文件、詢諮醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
療效或效果	[1] 頭痛、牙痛、拔牙後的疼痛、咽喉痛、耳朵痛、關節痛、神經痛、腰痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、月經痛(生理痛)、外傷痛的鎮痛 [2] 惡寒、發燒時的解熱
用法及用量	出現症狀時、請盡量避開空腹時、服用下述的1次服用量。服用間隔4小時以上。 [年齡：1次服用量：1天服用次數] 成人(15歲以上)：1顆：最多2次限制。(但是、如果症狀復發、您可以服用第三劑。) 未滿15周歲：請勿服用
用法及用量相關的注意事項	[1] 請嚴格遵守規定的用法・用量。 [2] 膠囊取出方式 將包覆錠劑的PTP凸起部分以指腹向下擠壓、內部鋁箔破開後取出藥劑服用。(若不小心誤食可能造成刺穿食道黏膜等意外事故。)
成分及分量	每1膠囊 布洛芬：200mg：緩解頭痛、生理痛、牙痛等。發燒時的解熱。
添加劑	聚山梨醇酯80、羥基化K、明膠、琥珀酸化明膠、來自玉米澱粉的糖醇、梔子色素
保管及使用上的注意事項	[1] 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。 [2] 請保管於兒童拿不到的地方。 [3] 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質)。 [4] 請勿使用超過有效期限的產品。 [5] 由於膠囊容易受潮、故請注意不要用沾濕的手等觸摸。

客戶服務台	有關此產品的諮詢、請聯絡您購買的商店或以下方式： 客戶服務中心[佐藤製藥有限公司] 電話：03-5412-7393 接待時間：9：00-17：00(週六、週日及假日除外) 電話諮詢僅提供日語服務。
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂1丁目5番27號
劑型	膠囊
藥品類別	一般用醫藥類
版本號	6
不良反應救濟系統的聯絡方式	藥品及醫療器材管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話：0120-149-931(免付費)
多語種產品信息的免責聲明	◆ 多語言產品資訊是產品說明書的翻譯、僅供參考。 ◆ 我們不保證本產品的內容或產品本身符合日本以外的法規。