


風險類別	需要指導的藥物
藥效學分類	鼻炎的滴鼻劑
產品名稱	ナゾネックス点鼻薬＜季節性アレルギー専用＞ NASONEX NASAL SPRAY [FOR RHINITIS FROM SEASONAL ALLERGIES]
產品功能	● 透過Mometasone furoate monohydrate 的作用、可減輕鼻腔內充血和炎症、使鼻子變得通暢。 ● 本品為可噴出定量藥液的噴霧劑。
使用上的注意事項	■ 禁止事項 (若不遵守、現在的症狀會惡化、或者容易引發副作用) 1. 下列的人請勿使用 (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成份引起過敏症狀的人。 (2) 未滿15歲的兒童。 (3) 孕婦或可能懷孕的人。 (4) 鼻腔內有化膿(積膿、伴隨疼痛、腫脹)、潰瘍、損傷的人。鼻部手術後尚未完全癒合的人。 (5) 接受過下列診斷的人。 系統性真菌病、結核病、感染、眼部單純疱疹、反覆鼻出血 (6) 過去1年內使用類固醇鼻腔噴劑3個月以上的人。 2. 本藥每年使用時間不得超過3個月、包括同時使用其他類固醇鼻噴劑。 (如果需要使用超過3個月、請諮詢耳鼻喉科醫生、因為這可能是其他疾病的徵兆。) 3. 請勿將此藥與其他類固醇鼻噴劑合併使用。但是、如果您的醫生開了處方、請按照說明進行操作。 ■ 諮詢事項 1. 下列的人於服用前、請諮詢醫師或藥劑師 (1) 正在接受醫師治療的人。 (2) 正在哺乳的人。 (3) 年長者。 (4) 曾因藥品等、引發過敏症狀的人。 (5) 有下列症狀的人。 頭部、前額、臉頰等處疼痛、流黃綠色鼻涕(感染性鼻竇炎)、鼻過沉重感、流少量鼻涕或流黃綠色鼻涕(肥厚性鼻炎)、鼻塞、鼻音、鼻後部有異物感等(鼻息肉) (6) 正在接受脫敏治療等過敏治療的人。 (7) 接受長期或大劑量全身性類固醇治療的人。 (8) 症狀不清楚是否由季節性過敏或其他因素引起的人。 2. 使用後、出現下列症狀的情況下、有可能是副作用、請立刻停止服用、攜帶此文件、諮詢醫師或藥劑師 相關部位：症狀 ○ 鼻子：刺激、搔癢、乾燥、疼痛、發紅、不適、流鼻血、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、氣味異常、鼻內結痂、灼熱感 ○ 喉嚨：刺激、疼痛、不適、乾燥、腫脹 ○ 皮膚：皮疹 ○ 神經精神：頭痛、疲勞 ○ 呼吸系統：咳嗽 ○ 其他：味覺障礙 如果擤鼻涕太用力、也會導致流鼻血、但如果經常流鼻血或鼻內結痂、可能會發展為鼻中隔穿孔、因此請立即停止使用並就醫。 ◦ 鼻中隔穿孔：鼻腔內左右鼻腔之間的壁上出現一個洞的情況。 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下、請立刻接受醫師的診療。 症狀名稱：症狀 ○ 休克(過敏性)：使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。 3. 使用本藥後、若出現頭部、額頭、臉頰等部位疼痛、或流出黃色或綠色鼻涕等症狀、請立即停止使用、並持此說明書諮詢醫生或藥劑師(可能同時出現其他疾病)。 4. 如果使用約一週後症狀仍未改善、請停止使用並持此說明書諮詢醫生或藥劑師。
療效或效果	緩解鼻塞、流鼻水、打噴嚏等季節性花粉過敏症狀
功效与效果相關的注意	
用法及用量	向每個鼻孔噴灑以下量。 [年齡：每次使用量：每日使用次數] 成人(15 歲及以上)：每個鼻孔噴 2 次：1 次 15歲以下：請勿使用 ● 每年使用時間不得超過 3 個月。
用法及用量相關的注意事項	[1] 本藥品含有糠酸莫米松水合物(一種類固醇)。如果過量使用或使用不當、可能會引起副作用。請嚴格遵守規定的劑量和用法。 [2] 僅用於鼻腔給藥。 [3] 使用產品時、如發現有味道、請漱口。
成分及分量	每100g中 糠酸莫米松水合物 52 毫克(糠酸莫米松 50 毫克)
成分和數量相關的注意	
添加劑	苯扎氯銨溶液、聚山梨醇酯80、結晶纖維素、羧甲基纖維素鈉、濃甘油、pH調節劑
保管及使用上的注意事項	[1] 請蓋緊後 保管於陽光直射不到且濕氣少的陰涼處。 [2] 請保管於兒童拿不到的地方。 [3] 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質)。 [4] 請勿與他人共用。 [5] 請勿使用超過有效期限的產品。此外、即使有效期內也請在開封後儘快使用。
客戶服務台	有關此產品的諮詢、請聯絡您購買的商店或以下方式： 客戶服務中心[佐藤製藥有限公司] 電話：03-5412-7393 接待時間：9：00-17：00(週六、週日及假日除外) 電話諮詢僅提供日語服務。

使用方法	[1] 請先擤鼻涕、保持鼻腔通暢。 [2] 使用前、請充分上下搖晃容器、將瓶蓋筆直向上拔出。(請勿扭轉瓶蓋。) [3] 請握緊容器。(初次使用時、請向空中噴壓10次左右、確認液體變成霧狀後再使用。) [4] 請稍微低下頭、將噴嘴前端放入鼻腔內、左右鼻腔各噴一下。 [5] 請用鼻吸氣、用嘴呼氣、讓藥物遍佈鼻腔深處。 [6] 請再次在左右鼻腔各噴一下。 [7] 請用鼻吸氣、用嘴呼氣、讓藥物遍佈鼻腔深處。 [8] 使用後、為了保持容器清潔、請擦拭與鼻子接觸的部位後再蓋上瓶蓋。 
使用時注意事項	[1] 使用前、請充分上下搖晃容器、將瓶蓋筆直向上拔出。 [2] 如果容器前端接觸到鼻涕等、可能會污染藥液、敬請注意。 [3] 噴嘴不要對準鼻中隔※、請筆直放入鼻腔內噴射。 尤其右利手人易對準右鼻中隔、左利手人易對準左鼻中隔、敬請注意。 ※鼻中隔：鼻孔內將鼻腔分為左右兩側的隔板樣結構 [4] 切勿用針等戳刺噴嘴前端、如果折斷、會非常危險。 
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂1丁目5番27號
劑型	噴霧劑
藥品類別	需要指導的藥物
版本號	1
不良反應救濟系統的聯絡方式	藥品及醫療器材管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話：0120-149-931(免付費)
多語種產品信息的免責聲明	◆ 多語言產品資訊是產品說明書的翻譯、僅供參考。 ◆ 我們不保證本產品的內容或產品本身符合日本以外的法規。