

风险类别	需要指导的药物
药效分类	质子泵抑制剂肠胃药
产品名称	オメプラール S OMEPRAZOLE 日本药典 奥美拉唑肠溶片
使用注意事项	<p>■ 禁止事项 (若不遵守则会导致当前病情恶化、或容易出现副作用及事故)</p> <p>1. 下述人群不要服用 (1) 曾因本品或本品所含成分引起过过敏症状的人。 (2) 服用以下药品的人群。 盐酸利匹韦林</p> <p>2. 在服用本药期间、不要服用下述药品 其他肠胃药</p> <p>3. 处于哺乳期时不要服用本药剂、或在服用本药剂时不要进行哺乳</p> <p>4. 服用时间不得超过 2 周、包括使用其他质子泵抑制剂 (严重的消化系统疾病可能会被忽视、因此请咨询医生。)</p> <p>■ 咨询事项</p> <p>1. 以下人群在服用前应咨询医师或药剂师 (1) 正在接受医师治疗的人群。 (2) 孕妇或有其可能性的人群。 (3) 老年人。 (4) 因药物等出现过过敏症状的人群。 (5) 接受以下诊断的人群。 肝病、胃或十二指肠溃疡 (6) 拥有以下症状的人群。 不明原因的体重减轻、持续的胃痛和腹痛</p> <p>2. 服用后若出现下述症状、则可能存在副作用、此时应立即中止服用、并携带本说明书咨询医师或药剂师 关系部分：病征 ○ 皮肤：皮疹、发红、瘙痒、荨麻疹 ○ 消化系统：腹泻、便溏、便秘、恶心、呕吐、腹胀、腹痛、口腔炎、舌炎、口干、吞咽困难、胃灼热、呕吐、口腔出现白斑(疑似念珠菌感染) ○ 神经精神：头痛、嗜睡、麻木等异常感觉、头晕、震颤、失眠、抑郁、暂时性昏迷、意识下降、昏厥 ○ 循环系统：心悸 ○ 泌尿系统：尿频 ○ 其他症状：视力模糊、发烧、肿胀、男性乳房发育(男性乳房变得像女性一样增大)、脱发、全身疲劳、关节痛、味觉异常、月经不调、肌肉痛、出汗、肌肉无力、面部和四肢抽搐、四肢肌肉僵硬和颤抖</p> <p>偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。 症状名称：症状 ○ 休克(过敏性)：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。 ○ 史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症：高烧、眼睛充血、眼膜、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。 ○ 横纹肌溶解症：出现手脚、肩、腰等肌肉疼痛、手脚发麻、使不上力、僵硬、全身无力、红褐色尿等症状。 ○ 肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸(皮肤或眼白发黄)、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。 ○ 肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛(各关节疼痛)、腹泻等症状。 ○ 间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧、并且突然出现或长时间持续。 ○ 血液疾病：症状包括喉咙痛、发烧、全身疲劳、面部或眼睑后部苍白、出血增多(牙龈出血、鼻子出血等)、瘀伤(按压时不会消失)、头晕、呼吸急促、眼白发黄、皮肤发黄和尿液发深。 ○ 视力障碍：难以看清字母和形状、视野异常等。 ○ 低钠血症：症状有抽搐、意识下降、头痛、恶心、呕吐等。 ○ 思维混乱：症状包括注意力不集中、回答问题不正确、行为混乱。</p> <p>3. 若服用3天后症状仍无改善则应中止服用、并携带本说明书咨询医师或药剂师</p>
效能或效果	胃痛、胃灼热、沉重感(本药含有质子泵抑制剂、可抑制胃酸分泌)
用法及用量	<p>[年龄：1次服用量：1天服用次数] 成人(15岁以上)：1片：1次 儿童(不满15岁)：请勿服用 ● 请勿服用此药超过2周。</p>
用法及用量相关注意	<p>[1] 请严格遵守规定的用法·用量使用。 [2] 本药剂是在肠内溶解的药物、请勿咀嚼或压碎服用。 [3] 1天1次、请在同一时间段服用。 [4] 如果症状消失、请停止服用。 [5] 药片取出方法 用手指用力按压装有药片的PTP包装凸起部、压破反面铝箔后取出药片服用。(如果不小心误吞铝箔、可能会发生铝箔卡在食道粘膜等意外事故。)</p>
成分、数量和功能	每1片中 奥美拉唑：10mg：通过抑制质子泵的作用来抑制胃酸分泌。
添加剂	含有以下添加剂：月桂醇硫酸酯钠、鲸蜡醇、乳糖一水合物、羧甲淀粉钠、羟丙基纤维素、氢氧化镁、硬脂酸镁、羟丙基甲基纤维素、合成水滑石、氧化钛、羟丙甲纤维素邻苯二甲酸酯、滑石、巴西棕榈蜡。

保管及使用注意事项	[1] 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所。 [2] 保管在儿童无法触及的地方。 [3] 不要移至其他容器中(会导致误用或变质)。 [4] 请勿服用超过有效期的产品。
客户服务台	有关此产品的咨询、请联系您购买的商店或以下方式： 客户服务中心[佐藤制药有限公司] 电话：03-5412-7393 接待时间：9: 00-17: 00(周六、周日及节假日除外) 电话咨询仅提供日语服务。
生产销售公司	佐藤制药有限公司 东京都港区元赤坂1丁目5番27号
剂型	药片
药品类别	需要指导的药物
版本号	2
不良反应救济系统的联系方式	药品和医疗器械管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 电话：0120-149-931(免费)
多语种产品信息的免责声明	◆ 多语言产品信息是产品说明书的翻译、仅供参考。 ◆ 我们不保证本产品的内容或产品本身符合日本以外的法律法规。