

위험 구분	지도가 필요한 의약품
약효 분류	프로톤 펌프 억제제위장약
제품 이름	オメプラールS OMEPRAL S 일본 약국방 오메프라졸 장용정
제품의 특징	
사용상의 주의	■ 해서는 안 되는 것 (지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용/사고가 일어나기 쉽다) - 다음에 해당하는 사람은 복용하지 말 것 (1) 본제 또는 본제 성분에 의해 알레르기 증상 을 일으킨 적이 있는 분. (2) 다음의 의약품을 복용 중인 사람. 릴피비린염산염 - 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것 다른 위장약 - 수유 중인 사람은 본제를 복용하지 않으며, 본제를 복용할 경우에는 수유를 피할 것 - 다른 양성자 펌프 억제제의 사용 기간도 합쳐 2주를 넘어 계속 복용하지 말아 주세요. (중대한 소화기 질환을 간과할 우려가 있으므로, 의사의 진찰을 받아 주세요.) ■ 상담할 내용 - 다음에 해당하는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상담할 것 (1) 의사 의 치료를 받고 있는 사람. (2) 임신부 또는 임신중이라고 생각되는 사람. (3) 고령자. (4) 약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람. (5) 다음의 진단을 받은 사람. 간장 병, 위/십이지장궤양 (6) 다음의 증상이 있는 사람. 원인불명의 체중감소, 지속적인 위통 및 복통 - 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사 또는 약사 상담할 것. 관계부위: 증상 ○ 피부: 발진, 발적, 가려움증, 두드러기 ○ 소화기: 설사, 무른 변, 변비, 메스꺼움·구토, 복부팽만감, 복통, 구내염, 설염, 입 마름, 삼키기 어려움, 속 쓰림, 구토, 구강 백반(칸디다증이 의심됨) ○ 정신 신경계 : 두통, 졸음, 마비 등의 비정상적인 감각, 현기증, 체, 불면, 우울증 상태, 일시적으로 멍하니, 의식의 저하, 신경을 잃는다 ○ 순환기: 두근거림 ○ 비뇨기: 빈뇨 ○ 기타: 눈의 흐림, 발열, 붓기, 여성화 유발 (남성의 유발이 여성처럼 부풀어 오름), 탈모, 몸, 처짐, 관절통, 미각 이상, 월경 이상, 근육통, 발한, 근육의 저하, 얼굴과 사지의 근육이 딱딱하고 손발의 근육이 경직되어 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것. 증상의 명칭: 증상 ○ 쇼크(아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목천소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다. ○ 피부 점막만 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 유행증: 고열, 눈의 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적 등이 지속되거나 급격히 악화된다. ○ 횡문근 유행증: 팔다리/어깨/허리 등의 근육이 아프고, 손발 저림, 힘이 들어가지 않는 증상, 경직, 전신의 나른함, 적갈색뇨 등이 나타난다. ○ 간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다. ○ 신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통(마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다. ○ 간질성 폐렴: 계단을 오를 때나 과로할 때 숨이 차거나 숨쉬기가 어려우며, 갑작스러운 건조한 기침과/또는 발열 및 지속적인 증상. ○ 혈액 장애: 인후 통증, 발열, 나른함, 얼굴이나 눈꺼풀 안쪽이 하얗게, 출혈이 쉽게 발생함(잇몸 출혈, 코피 등), 시퍼런 멍이 들(눌러도 색이 사라지지 않음), 현기증, 숨이 참, 눈의 흰자위가 노랗게 변함, 피부가 노랗게 변함, 소변색이 진해짐 등이 나타난다. ○ 시력 장애: 글자나 형태가 잘 보이지 않음, 시야 이상 등이 나타난다. ○ 저나트륨혈증: 경련, 의식 저하, 두통, 메스꺼움, 구토 등이 나타난다. ○ 착란 상태: 주의력이 산만해짐, 질문에 틀린 답을 함, 행동이 정돈되지 못함 등이 나타난다. 3일간 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사또는약사 상담할 것
효능 또는 효과	위통, 속 쓰림, 더부룩함(본제에는 위산의 분비를 저해하는 프로톤 펌프 억제제가 함유되어 있음)
효능 효과 관련 주의	
용법 및 용량	[연령: 1회 복용량: 1일 복용횟수] 성인(15세 이상): 1정: 1회 소아(15세 미만): 복용하지 마십시오. ● 2주 이상 연속해서 복용하지 마십시오.
용법 및 용량에 관한 주의	[1] 정해진 용법·용량을 준수해 주십시오. [2] 본제는 장에서 녹는 약이므로 씹거나 부수지 말고 그대로 복용하십시오. [3] 하루에 1회씩 같은 시간대에 복용하십시오. [4] 증상이 나아진 경우에는 복용을 중지해 주십시오. [5] 정제 꺼내는 방법 정제가 들어 있는 PTP 시트의 돌출된 부분을 손가락으로 세계 눌러 알루미늄 호일을 찢어 꺼낸 후 복용하십시오. (실수로 그대로 삼키거나 하던 식도 점막에 꽃히는 등 예상치 못한 사고로 연결됩니다.)
성분, 양 및 기능	1정중 오메프라졸: 10mg: 양성자 펌프의 작용을 억제하여 위산의 분비를 억제합니다.
성분 분량 관련 주의	
첨가물	첨가제로서 라우릴황산Na, 세탄올, 유당수화물, 전분글리콜산Na, 히드록시프로필셀룰로오스, 수산화Mg, 스테아르산Mg, 히프로멜로스, 합성히드로탈사이트, 산화티탄, 히프로멜로스프탈산에스테르, 탈크, 카르나우바로우를 포함합니다.
보관 및 취급상의 주의	[1] 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. [2] 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. [3] 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 염려가 있습니다). [4] 사용 기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.
고객 서비스 데스크	본제품에 관한 문의는, 매입의 가게 또는 하기에 부탁 말씀드립니다. 고객 상담 창구[사토제약주식회사] 전화 03-5412-7393 접수 시간 9:00-17:00 (토, 일, 공휴일 제외) 전화로의 문의는 일본어만이 됩니다.
제조 판매 회사	사토제약주식회사 도쿄도 미나토구 모토아카사카 1-5-27
투약 형태	정제
의약품 구분	지도가 필요한 의약품
버전 번호	2
부작용 피해 구제 제도의 문의처	(독)의약품 의료가기 종합 기구 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 전화 0120-149-931(프리 다이얼)
다국어 제품 정보에 대한 고지 사항	◆ 다국어 제품 정보는, 그 제품의 첨부 문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. ◆ 그 기재 내용 및 그 제품 자체가 일본국 이외의 법규에 적합하는 것을 보증하지 않습니다.