

風險類別	需要指導的藥物
藥效學分類	質子幫浦抑制劑腸胃藥
產品名稱	オメプラール S OMEPRAZOLE 日本藥典 奧美拉唑腸溶錠
產品功能	<p>■ 禁止事項 (若不遵守、現在的症狀會惡化、或者容易引發副作用・意外)</p> <p>1. 下列的人請勿服用 (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成份引起過敏症狀的人。 (2) 正在服用下列醫藥品的人。 鹽酸利匹韋林</p> <p>2. 服用本藥劑的期間、請勿服用下列醫藥品 其他腸胃藥</p> <p>3. 正在哺乳的人請勿服用本藥劑、或者服用本藥劑的情況下、請避免哺乳</p> <p>4. 服用時間不得超過 2 周、包括使用其他質子泵抑制劑 (嚴重的消化系統疾病可能會被忽視、因此請諮詢醫生。)</p> <p>■ 諮詢事項</p> <p>1. 下列的人於服用前、請諮詢醫師或藥劑師 (1) 正在接受醫師治療的人。 (2) 孕婦或可能懷孕的人。 (3) 年長者。 (4) 曾因藥品等、引發過敏症狀的人。 (5) 接受過下列診斷的人。 肝病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍 (6) 有下列症狀的人。 不明原因的體重減輕、持續的胃痛和腹痛</p> <p>2. 服用後、出現下列症狀的情況下、有可能是副作用、請立刻停止服用、攜帶此文件、諮詢醫師或藥劑師 關係部分：病徵 ○ 皮膚：發疹、發紅、發癢、蕁麻疹 ○ 消化器官：腹瀉、軟便、便祕、噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、口腔潰瘍、舌炎、口乾、吞嚥困難、火燒心、嘔吐、口腔黏膜白斑(疑似感染念珠菌) ○ 精神神經系統：頭痛、嗜睡、發麻等異常感覺、頭暈、發抖、失眠、抑鬱狀態、短暫性眩暈、意識水平下降、昏厥 ○ 循環器官：心悸 ○ 泌尿器官：尿頻 ○ 其他：視力模糊、發燒、浮腫、男性女乳症(男性乳房隆起如女性乳房)、脫髮、身體無力、關節痛、味覺異常、月經異常、肌肉疼痛、出汗、肌無力症、面部和四肢肌肉抽搐、四肢肌肉僵直顫抖 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下、請立刻接受醫師的診療。</p> <p>症狀名稱：症狀 ○ 休克(過敏性)：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。 ○ 史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹、發紅等持續、或者突然惡化。 ○ 橫紋肌融解症：手腳、肩、腰等的肌肉疼痛、手腳痠麻、無力、僵硬、全身倦怠、紅褐色尿等。 ○ 肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。 ○ 腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。 ○ 間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體、就會突然出現氣短呼吸困難、乾咳、發燒等、或者持續這些症狀。 ○ 血液疾病：症狀包括喉嚨痛、發燒、全身疲勞、臉部或眼瞼後部蒼白、出血增加(牙齦出血、鼻子出血等)、瘀傷(按壓時不會消失)、頭暈、呼吸急促、眼白髮黃、皮膚發黃和尿液發深。 ○ 視力障礙：出現看不清文字和形狀、視野異常等症狀。 ○ 低血鈉症：出現痙攣、意識水準下降、頭痛、噁心、嘔吐等症狀。 ○ 意識錯亂：出現注意力分散、答非所問、行為不協調等症狀。</p> <p>3. 服藥3天後症狀無改善、請停止服藥並持本說明書諮詢醫生或藥師。</p>
使用上的注意事項	胃痛、胃灼熱、沉重感(本藥含有質子幫浦抑制劑、可抑制胃酸分泌)
療效或效果	
功效與效果相關的注意	[年齡：1次服用量：1天服用次數] 成人(15歲以上)：1粒：1次 兒童(不滿15歲)：請勿服用 ● 請勿服用此藥超過2週。
用法及用量	[1] 請嚴格遵守規定的用法・用量。 [2] 本藥劑是在腸內溶解的藥物、請勿咀嚼或壓碎服用。 [3] 1天1次、請在同一時間段服用。 [4] 症狀痊癒後、請停止服用。 [5] 藥錠取出方法 將包覆錠劑的PTP包裝凸起部分以指腹向下擠壓、反面鋁箔破開後取出藥劑服用。(若不小心誤食、可能會造成刺穿食道黏膜等意外事故。)
用法及用量相關的注意事項	每1錠中 奧美拉唑：10mg：透過抑制質子幫浦的作用來抑制胃酸分泌。
成分、數量和功能	含有以下添加劑：月桂基硫酸鈉、鯨蠟醇、乳糖一水合物、羧甲基纖維素、氫氧化鎂、硬脂酸鎂、羥丙基甲基纖維素、合成水滑石、氧化鈦、羥丙基甲基纖維素鄰苯二甲酸酯、滑石、巴西棕櫚蠟。
保管及使用上的注意事項	[1] 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。 [2] 請保管於兒童拿不到的地方。 [3] 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質)。 [4] 請勿使用超過有效期限的產品。
客戶服務台	有關此產品的諮詢、請聯絡您購買的商店或以下方式： 客戶服務中心[佐藤製藥有限公司] 電話：03-5412-7393 接待時間：9：00-17：00(週六、週日及假日除外) 電話諮詢僅提供日語服務。
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂1丁目5番27號
劑型	藥片

藥品類別	需要指導的藥物
版本號	2
不良反應救濟系統的聯絡方式	藥品及醫療器材管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話：0120-149-931(免付費)
多語種產品信息的免責聲明	◦ 多語言產品資訊是產品說明書的翻譯、僅供參考。 ◦ 我們不保證本產品的內容或產品本身符合日本以外的法規。