

风险类别	指定第 2 类药品
药效分类	感冒药
产品名称	ストナジェルサイナスEX STONA GEL SINUS EX
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这是一种感冒药，其中含有颠茄总生物碱、盐酸二苯基吡啶、对感冒的流鼻涕有极好的效果。</li> <li>● 对乙酰氨基酚具有退烧功效、可缓解头痛等痛楚。</li> <li>● 容易吞咽且内部有液体的软胶囊。</li> </ul>
使用注意事项	<p>■ 禁止事项 (若不遵守则会导致当前病情恶化、或容易出现副作用及事故)</p> <p>1. 下述人群不要服用</p> <p>(1) 曾因本品或本品所含成分引起过过敏症状的人。</p> <p>(2) 因服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药而引发过哮喘的人群</p> <p>(3) 未满15岁的儿童。</p> <p>2. 在服用本药剂期间、不要服用下述任何医药品 其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等(鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等)、肠胃镇痛镇痉药</p> <p>3. 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类(会出现嗜睡、视线模糊、异常眩光等症状)</p> <p>4. 处于哺乳时期时不要服用本药剂、或在服用本药剂时不要进行哺乳</p> <p>5. 服用前后不要饮酒</p> <p>6. 请勿过量服用或长期使用</p> <p>■ 咨询事项</p> <p>1. 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者</p> <p>(1) 正在接受医师或牙科医师治疗的人群</p> <p>(2) 孕妇或有其可能性的人群。</p> <p>(3) 老年人。</p> <p>(4) 因药物等出现过过敏症状的人群。</p> <p>(5) 拥有以下症状的人群。 高烧、排尿困难</p> <p>(6) 接受以下诊断的人群。 甲状腺功能障碍、糖尿病、心脏病、高血压、肝脏病、肾脏病、胃及十二指肠溃疡、青光眼、呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合症、肥胖症</p> <p>2. 服用后若出现下述症状、则可能存在副作用、此时应立即中止服用、并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者</p> <p>关系部分：病征</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 皮肤：起疹・发红、发痒</li> <li>○ 消化系统：恶心、呕吐、食欲不振、胃部不适、胃痛、腹痛、胃和腹部丰满、烧心、腹泻</li> <li>○ 精神神经系统：头晕、头痛、麻木</li> <li>○ 泌尿系统：排尿困难</li> <li>○ 其他：体温过低、脸部灼热、异常眩光、浮肿</li> </ul> <p>偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。</p> <p>症状名称：症状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 休克(过敏性)：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。</li> <li>○ 史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死脱落症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。</li> <li>○ 药物超敏反应综合征：出现皮肤大范围发红、全身性起疹、发烧、身体疲倦、淋巴结(颈部、腋窝、腹股沟等)肿大等症状。</li> <li>○ 肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸(皮肤或眼白发黄)、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。</li> <li>○ 肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛(各关节疼痛)、腹泻等症状。</li> <li>○ 间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧、并且突然出现或长时间持续。</li> <li>○ 哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。</li> <li>○ 呼吸抑制：出现气短、呼吸困难等症状。</li> </ul> <p>3. 服用后若出现下述症状、若症状持续或加重时应中止服用、并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者</p> <p>便秘、口腔干燥、嗜睡、视线模糊</p> <p>4. 如果服用5至6次后症状仍未改善、请停止使用并将本文档带给医生、药剂师或注册卖家。</p>
效能或效果	缓解各类感冒症状(鼻涕、鼻塞、喷嚏、咽喉疼痛、咳嗽、咳痰、恶寒、发烧、头疼、关节痛、肌肉疼痛)
用法及用量	<p>尽量在餐后30分钟内服用。1次服用量如下所示。</p> <p>[年龄：1次服用量：1天服用次数]</p> <p>成人(15岁以上)：2粒：3次</p> <p>未满15周岁：请勿服用</p>
用法及用量相关注意	<p>[1] 请严格遵守规定的用法・用量使用。</p> <p>[2] 胶囊取出方式 请用手指用力按压装入胶囊的PTP包装的凸起部、压破反面的铝箔后取出胶囊服用。(如果不小心误吞铝箔、可能发生铝箔卡在食道粘膜等意外事故、敬请注意。)</p>
成分及分量	<p>每6胶囊中</p> <p>颠茄总生物碱：0.6mg：作用于副交感神经、可缓解流鼻涕症状。</p> <p>盐酸二苯基吡拉林：4mg：可缓解流鼻涕、鼻塞、打喷嚏等症状。</p> <p>对乙酰氨基酚：900mg：有效缓解发烧、发冷、头痛、咽喉疼痛、全身疼痛等症状。</p> <p>dl-盐酸甲基麻黄碱：60mg：可缓解咳嗽症状。</p> <p>双氢可待因磷酸盐：24mg：可缓解咳嗽症状。</p> <p>那可丁：48mg：可缓解咳嗽症状。</p> <p>盐酸氨溴索：45mg：轻松排出痰液。</p> <p>无水咖啡因：75mg：增强解热镇痛成分的功效。</p> <p>核黄素：12mg：补充感冒时容易缺乏的维生素。</p>
成分及分量相关注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由于本品中含有维生素B2磷酸酯、服用后尿液可能变黄。</li> </ul>
添加剂	十二烷基硫酸钠、聚山梨醇酯80、丙二醇脂肪酸酯、甘油脂肪酸酯、明胶、琥珀酸明胶、甘油、D-山梨糖醇、氧化钛、对羟基苯甲酸酯

保管及使用注意事项	<p>[1] 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所。</p> <p>[2] 保管在儿童无法触及的地方。</p> <p>[3] 不要移至其他容器中(会导致误用或变质)。</p> <p>[4] 请勿服用超过有效期的产品。</p>
客户服务台	<p>有关此产品的咨询、请联系您购买的商店或以下方式：</p> <p>客户服务中心[佐藤制药有限公司]</p> <p>电话：03-5412-7393 接待时间：9：00-17：00(周六、周日及节假日除外)</p> <p>电话咨询仅提供日语服务。</p>
生产销售公司	<p>佐藤制药有限公司</p> <p>东京都港区元赤坂1丁目5番27号</p>
剂型	胶囊
药品类别	一般用医药品
版本号	5
不良反应救济系统的联系方式	<p>药品和医疗器械管理局</p> <p><a href="https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html">https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html</a></p> <p>电话：0120-149-931(免费)</p>
多语种产品信息的免责声明	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 多语言产品信息是产品说明书的翻译、仅供参考。</li> <li>◆ 我们不保证本产品的内容或产品本身符合日本以外的法律法规。</li> </ul>