2026년 2월 개정 (기재 요령 변경에 따른 개정)

| | |
|---|---|
| 위험수준 구분 | 지정 제2류 의약품 |
| 약효 분류 | 감기약 |
| 제품 이름 | ストナアイビージェルEX STONA IB GEL EX |
| 제품의 특징 | ● 인후통 등 감기의 여러 증상에 효과가 있는 이부프로펜이나 트라넥삼산이 배합된 감기약입니다.<br>● 브롬헥신염산염이 목에 낀 가래의 농도를 낮춰 줍니다.<br>● 마시기 좋은 소프트 캡슐에서 내용물은 액상으로 만들어지고 있습니다. |
| 사용상의 주의 | ■ 해서는 안 되는 것<br>(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용/사고가 일어나기 쉽다)<br>1. 다음에 해당하는 사람은 복용하지 말 것<br>(1) 본제 또는 본제 성분에 의해 알레르기 증상 을 일으킨 적이 있는 분.<br>(2) 본제 또는 다른 해열 진통제, 감기약을 복용하여 천식을 일으킨 적이 있는 사람.<br>(3) 15세 미만의 소아.<br>(4) 출산 예정일 12주 이내의 임산부.<br>(5) 의료기관에서 다음 질병의 치료와 의약품의 투여를 받고있는 사람.<br>위 · 십이지장 궤양, 혈액 질환, 간 질환, 신장 질환, 심장 질환, 고혈압, 지도부진 (레토로비루 등)를 투여중인 사람<br>2. 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것<br>다른 감기약, 해열 진통제, 진정제, 진해 거담제, 항히스타민제를 함유하는 내복약 등(비염용 내복약, 멀미약, 알레르기용 약 등)<br>3. 복용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 않을 것(졸음 등이 나타날 수 있다.)<br>4. 수유 중인 사람은 본제를 복용하지 않으며, 본제를 복용할 경우에는 수유를 피할 것<br>5. 복용 전후에 음주하지 않을 것<br>6. 5일을 초과해서 복용하지 않을 것<br>7. 과량 복용하지 마십시오<br><br>■ 상담할 내용<br>1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것<br>(1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.<br>(2) 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.<br>(3) 고령자.<br>(4) 약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.<br>(5) 다음의 증상이 있는 사람.<br>고열,배뇨 곤란<br>(6) 다음의 진단을받은 사람 또는 질병에 걸린 적이있는 사람.<br>위 · 십이지장 궤양, 혈액 질환, 간 질환, 신장 질환, 심장 질환, 고혈압, 기관지 천식, 전신성 홍 반성 루푸스, 혼합 성 결합 조직 질환, 궤양 성 대장염, 크론 병, 갑상선 기능 장애, 당뇨병, 녹내장, 혈전 있는 사람 (뇌 혈전, 심근 경색, 혈전 성 정맥염) 혈전증을 일으킬 우려가있는 사람, 호흡 기능 장애, 폐쇄성 수면 무호흡증, 비만<br><br>2. 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것<br>관계부위: 증상<br>○ 피부: 발진/발적, 가려움, 푸른 멍<br>○ 소화기: 메스꺼움/구토, 식욕 부진, 위통,위부 불쾌감, 구내염,속쓰림,더부룩함, 위장 출혈, 복통, 설사, 혈변<br>○ 정신 신경계: 현기증, 불면증, 기분이 막는다<br>○ 순환기: 두근거림<br>○ 호흡기: 숨이 참<br>○ 비뇨기: 배뇨 곤란<br>○ 기타: 눈 침침함,이명,붓기,코피,잇몸 출혈, 출혈이 멈추지 않는 증상,출혈 ,등 통증,과도한 체온 저하, 나른함<br><br>드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.<br>증상의 명칭: 증상<br>○ 쇼크(아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉰소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.<br>○ 피부 점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 융해증: 고열, 눈의 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적 등이 지속되거나 급격히 악화된다.<br>○ 소화기 장애: 운항 검게, 토혈, 혈변, 점액 혈변 (혈액/점액/고름이 섞인 부드러운 항공편) 등이 나타난다.<br>○ 간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.<br>○ 신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통(마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다.<br>○ 무균성 뇌막염: 목덜미가 당기는 심한 두통, 발열, 메스꺼움·구토 등이 나타난다. (이러한 증상은 특히 전신성 홍반성 낭창 또는 혼합성 결합 조직 질환의 치료를 받고 있는 사람에게서 많이 보고되고 있다.)<br>○ 간질성 폐렴: 계단을 오를 때나 과로할 때 숨이 차거나 숨쉬기가 어려우며, 갑작스러운 건조한 기침과/또는 발열 및 지속적인 증상.<br>○ 심근 경색: 끈적 끈적한 가슴 통증, 답답한, 차가운 땀이 나옵니다.<br>○ 뇌혈관 장애: 의식 저하/의식 상실, 단측 사지 움직임 곤란, 두통, 구토, 현기증, 말하기 곤란, 언어 실어증 등의 증상이 갑자기 나타날 수 있습니다.<br>○ 천식: 숨을 쉴 때 색색, 휙휙과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.<br>○ 재생 불량성 빈혈: 푸른 멍, 코피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보임, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어질해짐, 혈뇨 등이 나타난다.<br>○ 무과립구증: 갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다.<br>○ 호흡억제: 숨이 참, 호흡 곤란 등이 나타남.<br>3. 복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.<br>변비,입마름,졸음<br>4. 5 ~ 6 회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 (특히 열이 3 일 이상 지속되거나 또 열이 반복 할 때)는 복용을 중지하고이 문서를 가지고 의사, 약제사 또는 등록 판매자 에 문의하십시오 |
| 효능 또는 효과 | 감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기,인후통,기침, 가래,오한,발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화 |
| 용법 및 용량 | 아래의 1회 복용량을 식후 가급적 30분 이내에 복용합니다.<br>[연령: 1회 복용량: 1일 복용횟수]<br>성인 (15세 이상): 2캡슐: 3회<br>15세 미만: 복용하지 마십시오 |
| 용법 및 용량에 관한 주의 | [1] 정해진 용법·용량을 준수해 주십시오.<br>[2] 캡슐 꺼내는 방법<br>캡슐이 들어 있는 PTP 시트의 돌출된 부분을 손가락으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일을 찢어 꺼낸 후 복용하십시오.(실수로 그대로 삼키거나 하면 식도 점막에 꽂히는 등 예상치 못한 사고로 연결됩니다.) |
| 성분 및 분량 | 6 캡슐 중<br>이부프로펜: 600mg: 발열, 두통, 인후통, 오한, 관절의 통증, 근육의 통증을 억제합니다.<br>트라넥삼산: 750mg: 항플라스민 작용으로 염증을 억제하고, 인후통 등 목 감기의 여러 증상에 효과를 나타냅니다.<br>브롬헥신염산염: 12mg: 기도의 분비를 촉진시켜, 목에 낀 가래를 묽게 해서 뱉어내기 쉽게 해줍니다.<br>디히드로코데인인산염: 24mg: 기침 중추에 작용하여 기침을 가라앉혀 줍니다.<br>dl-메틸에페드린염산염: 60mg: 기관지를 넓혀 기침을 가라앉히고 가래를 뱉어내기 쉽게 해줍니다.<br>d-클로르페니라민말레산염: 3.5mg: 콧물, 코막힘, 재채기 등의 증상을 억제합니다.<br>무수카페인: 75mg: 열이나 통증을 없애주는 성분의 작용을 돕습니다. |
| 첨가물 | 폴리 소르 베이트 80, 라 우릴 황산 Na, 글리세린 지방산 에스테르, 중간 사슬 지방, 수산화 K, 젤라틴, 호박 화 젤라틴, 글리세린, 산화 티타늄, 카민 |

| | |
|---|---|
| 보관 및 취급상의 주의 | [1] 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.<br>[2] 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.<br>[3] 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 염려가 있습니다).<br>[4] 사용 기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오. |
| 고객 서비스 데스크 | 본제품에 관한 문의는, 매입의 가게 또는 하기에 부탁 말씀드립니다.<br>고객 상담 창구[사토제약주식회사 ]<br>전화 03-5412-7393 접수 시간 9:00-17:00 (토, 일, 공휴일 제외)<br>전화로의 문의는 일본어만이 됩니다. |
| 제조 판매 회사 | 사토제약주식회사<br>도쿄도 미나토구 모토아카사카 1-5-27 |
| 투약 형태 | 캡슐 |
| 의약품 구분 | 일반 의약품 |
| 버전 번호 | 3 |
| 부작용 피해 구제 제도의 문의처 | (독)의약품 의료기기 종합 기구<br>https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html<br>전화 0120-149-931(프리 다이얼) |
| 다국어 제품 정보에 대한 고지 사항 | ◆ 다국어 제품 정보는, 그 제품의 첨부 문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다.<br>◆ 그 기재 내용 및 그 제품 자체가 일본국 이외의 법규에 적합하는 것을 보증하지 않습니다. |