| | |
|---|---|
| 風險類別 | 指定第2類藥品 |
| 藥效學分類 | 感冒藥 |
| 產品名稱 | ストナアイビージェルEX　STONA IB GEL EX |
| 產品功能 | ● 含有對喉嚨痛等感冒各種症狀有效的布洛芬和氨甲環酸的感冒藥。<br>● 鹽酸溴己新可淡化卡在喉嚨的濃痰。<br>● 易於使用的軟膠囊、內容物是液體。 |
| 使用上的注意事項 | ■ 禁止事項<br>(若不遵守、現在的症狀會惡化、或者容易引發副作用・意外)<br>1. 下列的人請勿服用<br>(1) 曾因本藥劑或本藥劑的成份引起過敏症狀的人。<br>(2) 曾服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥、引發氣喘的人。<br>(3) 未滿15歲的兒童。<br>(4) 預产期在12周以內的孕妇。<br>(5) 在醫療機構接受下列疾病治療或藥物治療的人。<br>那些正在服用胃/十二指腸潰瘍、血液疾病、肝臟疾病、腎臟疾病、心髒病、高血壓、齊多夫定的人。<br>2. 服用本藥劑的期間、請勿服用下列任何一種醫藥品。<br>其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等(鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等)<br>3. 服用後、請勿駕駛操作交通工具或機械類(可能出現嗜睡。)<br>4. 正在哺乳的人請勿服用本藥劑、或者服用本藥劑的情況下、請避免哺乳<br>5. 服用前後、請勿飲酒<br>6. 請勿服用超過5天<br>7. 請勿過量服用<br>■ 諮詢事項<br>1. 下列的人於服用前、請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者<br>(1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。<br>(2) 孕婦或可能懷孕的人。<br>(3) 年長者。<br>(4) 曾因藥品等、引發過敏症狀的人。<br>(5) 有下列症狀的人。<br>發高燒、排尿困難<br>(6) 具有以下診斷的人或患有該疾病的人。<br>十二指腸潰瘍、血液疾病、肝病、腎臟疾病、心髒病、高血壓、支氣管哮喘、系統性紅斑狼瘡、混合性結締組織病、潰瘍性結腸炎、克羅恩病、甲狀腺功能障礙、糖尿病、青光眼、血栓形成腦血栓、心肌梗塞、血栓性靜脈炎的人、可能發展為血栓形成的人、呼吸功能不全、阻塞性睡眠呼吸暫停、肥胖<br>2. 服用後、出現下列症狀的情況下、有可能是副作用、請立刻停止服用、攜帶此文件、詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者<br>關係部分：病徵<br>○ 皮膚：發疹、發紅、發癢、出現淤青<br>○ 消化器官：噁心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不適感、口內炎、胸口灼熱、腹脹、胃腸出血、腹痛、腹瀉、血便<br>○ 精神神經系統：頭暈、失眠、情緒波動<br>○ 循環器官：心悸<br>○ 呼吸器官：氣短<br>○ 泌尿器官：排尿困難<br>○ 其他：視力模糊、耳鳴、腫脹、流鼻血、牙齦出血、出血不易停止、出血、背痛、過度的體溫低下、身體倦怠<br>極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下、請立刻接受醫師的診療。<br>症狀名稱：症狀<br>○ 休克(過敏性)：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。<br>○ 史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹、發紅等持續、或者突然惡化。<br>○ 消化系統疾病：糞便發黑、吐血、血便、粘液便(軟便中含有血液、粘液、膿液)等。<br>○ 肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。<br>○ 腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。<br>○ 無菌性腦膜炎：出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心・嘔吐等。(尤其是接受全身性紅斑性狼瘡或混合性結締組織病治療的人當中、許多人自訴這種症狀。)<br>○ 間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體、就會突然出現氣短呼吸困難、乾咳、發燒等、或者持續這些症狀。<br>○ 心肌梗塞：出現胸悶、呼吸困難、出冷汗等症狀。<br>○ 腦血管障礙：突然出現意識減退・意識喪失、單側肢體活動困難、頭痛、嘔吐、頭暈、說話困難、言語失用等症狀。<br>○ 氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲、出現呼吸困難等。<br>○ 再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。<br>○ 無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。<br>○ 呼吸抑制：出現呼吸急促、呼吸困難等。<br>3. 服用後、可能出現下列症狀、這種症狀持續或變嚴重的情況下、請停止服用、攜帶此文件、詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者<br>便祕、口乾、嗜睡<br>4. 如果服用5到6次後症狀仍未改善(特別是如果發燒持續3天或更長時間、或者發燒再次發生)、請停止使用並與醫生、藥劑師或註冊賣家一起使用本文檔。 |
| 療效或效果 | 緩和感冒的各項症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、咳嗽、生痰、惡寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉疼痛) |
| 用法及用量 | 請盡量在飯後30分鐘以內、服用下述的1次服用量。<br>[年齡：1次服用量：1天服用次數]<br>成人(15歲以上)：2粒：3次<br>未滿15周歲：請勿服用 |
| 用法及用量相關的注意事項 | [1] 請嚴格遵守規定的用法・用量。<br>[2] 膠囊取出方式<br>將包覆錠劑的PTP凸起部分以指腹向下擠壓、內部鋁箔破開後取出藥劑服用。(若不小心誤食可能造成刺穿食道黏膜等意外事故。) |
| 成分及分量 | 每6膠囊<br>布洛芬：600mg：可抑制發燒、頭痛、喉嚨痛、惡寒、關節痛、肌肉疼痛。<br>傳明酸：750mg：抗纖溶酶的作用可抑制發炎、對喉嚨痛等的各種感冒症狀有效。<br>鹽酸溴克辛：12mg：提高呼吸道分泌、淡化喉嚨的卡痰使其易於排出。<br>雙氫可待因磷酸鹽：24mg：有效控制咳嗽中樞、有鎮咳功效。<br>dl-鹽酸甲基麻黃鹼：60mg： 能擴張支氣管、鎮咳及使痰易於排出。<br>d-氯苯那敏馬來酸鹽：3.5mg：可抑制打噴嚏、鼻水、鼻塞等症狀。<br>無水咖啡因：75mg：含有幫助祛熱解痛的成分。 |
| 添加劑 | 聚山梨酯80、十二烷基硫酸鈉、甘油脂肪酸酯、中鏈脂肪酸甘油三酸酯、氫氧化鉀、明膠、琥珀酸明膠、甘油、二氧化鈦、胭脂紅 |

| | |
|---|---|
| 保管及使用上的注意事項 | [1] 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。<br>[2] 請保管於兒童拿不到的地方。<br>[3] 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質)。<br>[4] 請勿使用超過有效期限的產品。 |
| 客戶服務台 | 有關此產品的諮詢、請聯絡您購買的商店或以下方式：<br>客戶服務中心[佐藤製藥有限公司]<br>電話：03-5412-7393 接待時間：9：00-17：00(週六、週日及假日除外)<br>電話諮詢僅提供日語服務。 |
| 生產銷售公司 | 佐藤製藥有限公司<br>東京都港區元赤坂1丁目5番27號 |
| 劑型 | 膠囊 |
| 藥品類別 | 一般用醫藥類 |
| 版本號 | 3 |
| 不良反應救濟系統的聯絡方式 | 藥品及醫療器材管理局<br>https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html<br>電話：0120-149-931(免付費) |
| 多語種產品信息的免責聲明 | ◆ 多語言產品資訊是產品說明書的翻譯、僅供參考。<br>◆ 我們不保證本產品的內容或產品本身符合日本以外的法規。 |