

ミルコデ錠Aのお問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号


服用される前に必ずお読みください。

第1類医薬品


つらいせき、たんに

ミルコデ錠A

気管支を広げてせきを鎮めるテオフィリン配合



ミルコデ錠Aの製品紹介



成分・分量と働き

6錠中

| 成分 | 分量 | 働き |
|---------------------------|--------|------------------|
| テオフィリン | 300mg | 気管支を広げ、咳を鎮めます。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 37.5mg | |
| グアイフェネシン | 300mg | たんをうすめて出しやすくします。 |
| キキョウエキス (原生薬量540mgに相当) | 120mg | |
| セネガエキス (原生薬量500mgに相当) | 30mg | |
| カンゾウエキス (原生薬量756mgに相当) | 108mg | |

添加物として、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタンを含有します。

効能

ぜんまい
せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をとまなうせき、たん

ミルコデ錠Aの製品紹介

用法・用量

下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。

| 年齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15才以上) | 2錠 | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないでください | |

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤を服用している間は、効果が弱まるおそれがありますので、セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を摂取しないでください。

※ 海外における研究において、テオフィリンについて、セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有製品との併用したときに血中濃度の低下又は作用の減弱が見られた症例が報告されています。従って、本剤を服用する際には、併用をさせていただきます。

(3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、

次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

※他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬等は、本剤と重複する成分や同種薬効成分を含んでいる可能性があり、併用することにより、本剤又は併用薬の薬理作用が増強され、副作用が強くあらわれるおそれがあります。

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、

本剤を服用する場合は授乳を避けてください

※テオフィリンは、母乳に移行し、乳児に神経過敏の有害反応をあらわす可能性があります。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 医師の治療を受けている人。

※医師の治療を受けている人が、自己の判断で薬剤を服用すると、同効薬剤の重複服用や処方薬剤との相互作用等を起こすおそれがありますので、服用に際しては医師等の専門家にご相談ください。

使用上の注意

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

※妊娠時に服用される薬剤の影響としては、(1)母体への副作用、(2)母体への作用を介した胎児への影響、(3)胎児への障害作用、(4)胎児への催奇形性作用、が考えられます。従って、妊婦又は妊娠していると思われる人は胎児への影響を考え、また、妊娠という特別な要因を考慮し、安易な薬剤の服用は避け、医師等の専門家にご相談ください。

(3) 高齢者。

※高齢者では、一般に心臓・血管系の機能低下、動脈硬化等による二次的な高血圧、腎・肝機能の低下等、生理機能の低下が考えられ薬剤の作用が強くあらわれることがあります。また、メチルエフェドリン塩酸塩により心搏亢進・血圧上昇がおこる可能性がありますので、医師等の専門家にご相談ください。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

※人によっては薬剤の服用によりアレルギーを起こすおそれがあります。アレルギー体質の人や、過去に薬剤によりアレルギーを起こしたことがある人は、アレルギーを起こした薬剤ならびにその類似した薬剤を服用する際には注意が必要です。

(5) 次の症状のある人。

高熱

※高熱のある人は、かぜ以外の感染症やその他の重篤な疾患も考えられます。

使用上の注意

(6) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

※【心臓病、高血圧、甲状腺機能障害(亢進症)】

気管支拡張薬・メチルエフェドリン塩酸塩は、交感神経刺激作用により心拍数を増加させ、血圧を上昇させるので疾患を悪化させるおそれがあります。

【糖尿病】

気管支拡張薬・メチルエフェドリン塩酸塩は、交感神経刺激作用により肝臓のグリコーゲンの分解を促進し、血糖値を上昇させるので、疾患を悪化させるおそれがあります。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃腸出血 |
| 精神神経系 | めまい、意識の低下、けいれん |
| 循 環 器 | 動悸 |
| 呼 吸 器 | 呼吸が荒い |
| そ の 他 | 貧血、からだがだるい |

※本剤の服用により、あらわれることがある副作用症状です。このような症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤化を防ぐため、服用を中止し、医師等の専門家にご相談ください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 横紋筋融解症 | 手足・肩・腰等の筋肉が痛む、手足がしびれる、力が入らない、こばる、全身がだるい、赤褐色尿等があらわれる。 |

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

※5～6回服用しても効果が見られない場合は、他の疾患や合併症の可能性も考えられますので、服用を中止し、医師等の専門家にご相談ください。

せきやたんが早く楽になるためのアドバイス

1. **睡眠**をとり無理をしないことが治療の第一歩。
外出するときは、あたたかくして体を冷やさないように注意しましょう。
2. **水分**を多くとるようにしましょう。
たんのきれがよくなり、せきが楽になります。
3. **部屋**の空気をきれいにしましょう。
また、部屋をあため、なるべく湯気をたてて空気の乾燥を防ぎましょう。
4. **うがい**を心がけましょう。
のどの不快感がやわらぎ、せきやたんが楽になります。
外出のときは、マスクも効果があります。

