

风险类别	指定第 2 类药品
药效分类	抗组胺药主药制剂
产品名称	スラジン A SURAZIN A
产品特点	● 抗过敏药、在具有抗组胺作用的马来酸氯苯那敏和具有收缩血管作用的消旋盐酸甲基麻黄碱中、添加对荨麻疹有效的茵陈蒿汤浸膏。
使用注意事项	■ 禁止事项 (若不遵守则会导致当前病情恶化、或容易出现副作用及事故) 1. 在服用本药剂期间、不要服用下述任何医药品 其他抗过敏药、含抗组胺剂的口服药等(感冒药、止咳化痰药、鼻炎内服药、晕车药等) 2. 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类(会出现嗜睡症状) 3. 请勿过量服用或长期使用 ■ 咨询事项 1. 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者 (1) 正在接受医师治疗的人群。 (2) 孕妇或有其可能性的人群。 (3) 哺乳期人群 (4) 老年人。 (5) 因药物等出现过过敏症状的人群。 (6) 拥有以下症状的人群。 排尿困难 (7) 接受以下诊断的人群。 心脏病、高血压、糖尿病、甲状腺功能障碍、青光眼 2. 服用后若出现下述症状、则可能存在副作用、此时应立即中止服用、并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者 关系部分：病征 ○ 皮肤：起疹・发红、发痒 ○ 消化系统：恶心・呕吐、食欲不振 ○ 泌尿系统：排尿困难 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。 症状名称：症状 ○ 再生障碍性贫血：出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适、难以站稳、血尿等症状。 ○ 粒细胞缺乏症：出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。 ○ 肠系膜静动脉硬化性肠炎：长期服用、会出现反复腹痛、腹泻、便秘、腹胀等。 3. 服用后若出现下述症状、若症状持续或加重时应中止服用、并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者 口腔干燥、嗜睡 4. 如果服用5至6次后症状仍未改善、请停止使用并将本文档带给医生、药剂师或注册卖家。
效能或效果	荨麻疹、湿疹、瘙痒、斑疹
用法及用量	按照下述1次服用量饭后服用。 [年龄：1次服用量：1天服用次数] 成人(15周岁以上)：1片：3次 未满15周岁：请勿服用
用法及用量相关注意	[1] 请严格遵守规定的用法・用量使用。 [2] 药片取出方法 用手指用力按压装有药片的PTP包装凸起部、压破反面铝箔后取出药片服用。(如果不小心误吞铝箔、可能会发生铝箔卡在食道粘膜等意外事故。)
成分及分量	每3片中 马来酸氯苯那敏：12mg：通过抗组胺作用、对荨麻疹、湿疹等过敏性疾病具有效果。 消旋盐酸甲基麻黄碱：36mg：作用于交感神经、通过收缩毛细血管、从而缓解荨麻疹、湿疹等引起的瘙痒。 茵陈蒿汤浸膏：160mg：含3种生药(茵陈蒿、山栀子、大黄)、对荨麻疹具有效果。
添加剂	乳糖、羟丙基纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素、聚氧乙烯聚氧丙烯二醇、聚乙烯醇(部分皂化物)、磷酸氢钙、滑石、聚二甲基硅氧烷、二氧化硅、氧化钛、白糖、聚维酮、红3号、黄5号、棕榈蜡
保管及使用注意事项	[1] 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所。 [2] 保管在儿童无法触及的地方。 [3] 不要移至其他容器中(会导致误用或变质)。 [4] 请勿服用超过有效期的产品。
客户服务台	有关此产品的咨询、请联系您购买的商店或以下方式： 客户服务中心[佐藤制药有限公司] 电话：03-5412-7393 接待时间：9：00-17：00(周六、周日及节假日除外) 电话咨询仅提供日语服务。
其他	[迅速康复的建议] [1] 若荨麻疹是因食物而引起、请勿再食用该食物。注意日常均衡饮食、忌辛辣、食用易消化食物。 [2] 勿抓挠患部。否则可能引起化脓等、导致病情恶化。 [3] 温水洗澡。热水洗澡可能会加重瘙痒。 [4] 调整排便。应尽快排出引发过敏的食物等。此外、腹泻等肠胃疾病也可能引起荨麻疹、应注意保护肠胃。
生产销售公司	佐藤制药有限公司 东京都港区元赤坂1丁目5番27号
剂型	药片
药品类别	一般用医药品
版本号	9
不良反应救济系统的联系方式	药品和医疗器械管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 电话：0120-149-931(免费)
多语种产品信息的免责声明	◆ 多语言产品信息是产品说明书的翻译、仅供参考。 ◆ 我们]不保证本产品的内容或产品本身符合日本以外的法律法规。