

위험수준 구분	지정 제2류 의약품
약효 분류	항히스타민제 주약제제
제품 이름	스라진A SURAZIN A
제품의 특징	● 항히스타민작용이 있는 클로르페니라민말레산염과 혈관수축작용이 있는 dl-메틸에페드린염산염에 두드러기에 효과가 있는 인진 호탕 엑스 함유된 항알레르기약입니다.
사용상의 주의	■ 해서는 안 되는 것 (지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용/사고가 일어나기 쉽다) 1. 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것 다른 알레르기용 약, 항히스타민제를 함유한 내복약 등 (감기약, 진해거담약, 비염용 내복약, 멀미약 등) 2. 복용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 않을 것(졸음 등이 나타날 수 있다.) 3. 과량 복용 · 장기 연용하지 마십시오 ■ 상담할 내용 1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것 (1) 의사 의 치료를 받고 있는 사람. (2) 임신부 또는 임신중이라고 생각되는 사람. (3) 수유 중인 사람. (4) 고령자. (5) 약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람. (6) 다음의 증상이 있는 사람. 배뇨 곤란 (7) 다음의 진단을 받은 사람. 심장병, 고혈압, 당뇨병, 갑상선 기능 장애, 녹내장 2. 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록 판매자와 상담할 것 관계부위: 증상 ○ 피부: 발진/발적, 가려움 ○ 소화기: 메스꺼움/구토, 식욕 부진 ○ 비뇨기: 배뇨 곤란 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것. 증상의 명칭: 증상 ○ 재생 불량성 빈혈: 푸른 명, 코피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보임, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어 질해짐, 혈뇨 등이 나타난다. ○ 무과립구증: 갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다. ○ 장간막 정맥경화증: 장기 복용으로 복통, 설사, 변비, 복부 팽만 등이 반복적으로 나타난다. 3. 복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의 사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것. 입마름, 졸음 4. 5 ~ 6 회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 는 복용을 중지하고이 문서를 가지고 의사, 약제사 또는 등록 판매자 에 문의하십시오
효능 또는 효과	두드러기, 습진, 가려움증, 발진
용법 및 용량	아래의 1회 복용량을 식후에 복용합니다. [연령: 1회 복용량: 1일 복용횟수] 성인(15세 이상): 1정: 3회 15세 미만: 복용하지 마십시오
용법 및 용량에 관 한 주의	[1] 정해진 용법·용량을 준수해 주십시오. [2] 정제 꺼내는 방법 정제가 들어 있는 PTP 시트의 돌출된 부분을 손가락으로 세게 눌러 알루미늄 호일을 찢어 꺼낸 후 복용하십시오. (실수로 그대로 삼키 거나 하면 식도 점막에 꽃히는 등 예상치 못한 사고로 연결됩니다.)
성분 및 분량	3정 중 클로르페니라민말레산염: 12mg: 항히스타민 작용에 의해 두드러기, 습진 등의 알레르기성 질환에 효과를 나타냅니다. dl-메틸에페드린 염산염: 36mg: 교감 신경에 작용하여 모세 혈관을 수축하여 두드러기, 습진 등의 가려움을 억제합니다. 인진호탕 엑스: 160mg: 3종류의 생약(인진초, 산치자, 대황)으로 구성되며, 두드러기에 효과를 나타내는 성분입니다.
첨가물	유당, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아린산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리옥시에틸렌 폴리옥시프로필렌글리콜, 폴리비닐알코올(부분 감화물), 인산수소칼슘, 셀룰, 디메틸폴리실록산, 이산화규소, 산화티타늄, 백당, 포비돈, 적색 3호, 황색 5호, 카르나우바납
보관 및 취급상의 주의	[1] 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. [2] 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. [3] 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 염려가 있습니다). [4] 사용 기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.
고객 서비스 데스크	본제품에 관한 문의는, 매입의 가게 또는 하기에 부탁 말씀드립니다. 고객 상담 창구[사토제약주식회사] 전화 03-5412-7393 접수 시간 9:00~17:00 (토, 일, 공휴일 제외) 전화로의 문의는 일본어만이 됩니다.
기타	[빨리 좋아 지도록위한 조언] [1] 두드러기가 음식으로 인해 일어났을 때는 그 음식을 섭취하지 않도록 합니다. 평소에도 균형 잡힌 식사에 유의하며, 강한 향신료를 피하고 소화가 잘 되는 음식을 섭취하십시오. [2] 환부는 긁지 않도록 합니다. 자칫하면 화농 등을 일으켜, 악화될 우려가 있습니다. [3] 목욕은 미지근한 물로 합니다. 뜨거운 물로 목욕을 하면 가려움증이 심해질 수 있습니다. [4] 배변을 정상화합니다. 원인이 된 음식 등을 빨리 배출해내기 위해 중요한 것입니다. 또한, 설사 등의 위장 장애도 두드러기를 일으 킬 수 있으므로 위장이 나빠지지 않게 주의하십시오.
제조 판매 회사	사토제약주식회사 도쿄도 미나토구 모토야카사카 1-5-27
투약 형태	정제
의약품 구분	일반 의약품
버전 번호	9
부작용 피해 구제 제도의 문의처	(독)의약품 의료기기 종합 기구 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 전화 0120-149-931(프리 다이얼)
다국어 제품 정보에 대한 고지 사항	◆ 다국어 제품 정보는, 그 제품의 첨부 문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. ◆ 그 기재 내용 및 그 제품 자체가 일본국 이외의 법규에 적합하는 것을 보증하지 않습니다.