

風險類別	指定第2類藥品
藥效學分類	抗組織胺藥主藥製劑
產品名稱	スラジンA SURAZIN A
產品功能	● 抗過敏藥、在具有抗組織胺作用的馬來酸氯苯那敏和具有收縮血管作用的消旋鹽酸甲基麻黃碱中、添加對蕁麻疹有效的茵陳蒿湯浸膏。
使用上的注意事項	■ 禁止事項 (若不遵守、現在的症狀會惡化、或者容易引發副作用・意外) 1. 服用本藥劑的期間、請勿服用下列任何一種醫藥品。 其他抗過敏藥、含抗組織胺劑的內服藥等(感冒藥、止咳化痰藥、鼻炎內服藥、暈車藥等) 2. 服用後、請勿駕駛操作交通工具或機械類(可能出現嗜睡。) 3. 請勿過量服用或長期使用 ■ 諮詢事項 1. 下列的人於服用前、請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 (1) 正在接受醫師治療的人。 (2) 孕婦或可能懷孕的人。 (3) 正在哺乳的人。 (4) 年長者。 (5) 曾因藥品等、引發過敏症狀的人。 (6) 有下列症狀的人。 排尿困難 (7) 接受過下列診斷的人。 心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能障礙、青光眼 2. 服用後、出現下列症狀的情況下、有可能是副作用、請立刻停止服用、攜帶此文件、諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 關係部分：病徵 ○ 皮膚：發疹・發紅、發癢 ○ 消化器官：噁心・嘔吐、食欲不振 ○ 泌尿器官：排尿困難 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下、請立刻接受醫師的診療。 症狀名稱：症狀 ○ 再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。 ○ 無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。 ○ 腸系膜靜脈硬化性腸炎：長期服用、會出現反覆腹痛、腹瀉、便秘、腹脹等。 3. 服用後、可能出現下列症狀、這種症狀持續或變嚴重的情況下、請停止服用、攜帶此文件、諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 口乾、嗜睡 4. 如果服用5到6次後症狀仍未改善、請停止使用並與醫生、藥劑師或註冊賣家一起使用本文檔。
療效或效果	蕁麻疹、濕疹、瘙癢、斑疹
用法及用量	按照下述1次服用量飯後服用。 [年齡：1次服用量：1天服用次數] 成人(15周歲以上)：1片：3次 未滿15周歲：請勿服用
用法及用量相關的注意事項	[1] 請嚴格遵守規定的用法・用量。 [2] 藥錠取出方法 將包裹錠劑的PTP包裝凸起部分以指腹向下擠壓、反面鋁箔破開後取出藥劑服用。(若不小心誤食、可能會造成刺穿食道黏膜等意外事故。)
成分及分量	每3錠 馬來酸氯苯那敏：12mg；透過抗組織胺作用、對蕁麻疹、濕疹等過敏性疾病具有效果。 消旋鹽酸甲基麻黃碱：36mg；作用于交感神經、透過收縮毛細血管、進而緩解蕁麻疹、濕疹等引起的搔癢。 茵陳蒿湯浸膏：160mg；含3種生藥(茵陳蒿、山梔子、大黃)、對蕁麻疹具有效果。
添加劑	乳糖、羥丙基纖維素、硬脂酸鎂、羥丙甲纖維素、聚氧乙烯聚氧丙烯二醇、聚乙醇醇(部分皂化物)、磷酸氫鈣、滑石、聚二甲基矽氧烷、二氧化矽、氧化鈣、白糖、聚維酮、紅3號、黃5號、棕櫚蠟
保管及使用上的注意事項	[1] 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。 [2] 請保管於兒童拿不到的地方。 [3] 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質)。 [4] 請勿使用超過有效期限的產品。
客戶服務台	有關此產品的諮詢、請聯絡您購買的商店或以下方式： 客戶服務中心[佐藤製藥有限公司] 電話：03-5412-7393 接待時間：9：00-17：00(週六、週日及假日除外) 電話諮詢僅提供日語服務。
其他	[迅速康复的建议] [1] 若蕁麻疹是因食物而引起、請勿再食用該食物。注意日常均衡飲食、忌辛辣、食用易消化食物。 [2] 勿抓撓患部。否則可能引起化膿等、導致病情惡化。 [3] 溫水洗滌。熱水洗滌可能會加重瘙癢。 [4] 調整排便。應儘快排出引發過敏的食物等。此外、腹瀉等腸胃疾病也可能引起蕁麻疹、應注意保護腸胃。
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司
	東京都港區元赤坂1丁目5番27號
劑型	藥片
藥品類別	一般用醫藥類
版本號	9
不良反應救濟系統的聯絡方式	藥品及醫療器材管理局 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話：0120-149-931(免付費)
多語種產品信息的免責聲明	◆ 多語言產品資訊是產品說明書的翻譯、僅供參考。 ◆ 我們不保證本產品的內容或產品本身符合日本以外的法規。