

药品类别	一般用医药品
药效分类	口腔溃疡专用药
产品名称	アフタガード AFTA GUARD
产品特点	本品为微甜的软膏型口腔溃疡用药。对口腔粘膜具有极强的粘着力，有效保护口腔溃疡患处。具有消炎功效的曲安奈德可缓解患处炎症，改善口腔溃疡。
效能或效果	口腔溃疡（口疮）
用法及用量	每天一到数次，适量涂抹于患处。
用法及用量相关注意	(1) 请严格遵守规定的用法、用量使用。 (2) 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。 (3) 本品仅用于口腔，请勿用于口腔以外的部位。 (4) 疼痛治愈后请停止使用。 (5) 使用后请暂时不要饮食。 (6) 请勿用于假牙粘合等治疗以外的目的。
成分及分量	每 100g 中 曲安奈德：100mg：缓解患处炎症，改善口腔溃疡。
使用注意事项	■禁止事项 （若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用） 1. 下述人群不要使用 (1) 怀疑为伴感染性疾病的口腔炎患者。（请向医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者咨询） ●口腔内整体弥漫用纱布等擦拭后可轻易剥落的白斑的患者。（怀疑为念珠菌感染性疾病） ●患部有黄脓者。（怀疑为细菌感染性疾病） ●口腔内多发米粒大～小豆大小水泡的患者，口腔粘膜以外的口唇、皮肤处也有水泡、起疹的患者。（怀疑为病毒感染性疾病） ●出现发热、食欲不振、全身倦怠感、淋巴结肿胀等全身症状者。（怀疑为病毒感染性疾病） (2) 口腔内伴有感染的患者。 （由于有因使用类固醇制剂而导致感染性疾病病情恶化的报告，故请勿用于有牙槽脓肿、牙周炎等口腔内存在感染的部位。） (3) 使用 5 日后仍未见症状改善的患者。 (4) 使用 1～2 日后仍见症状恶化的患者。 ■咨询事项 1. 以下人群在服用前应咨询医师、牙医药剂师或登录贩卖者 (1) 正在接受医师或牙科医师治疗的人群 (2) 因药物等出现过过敏症状的人群 (3) 孕妇或有其可能性的人群 (4) 哺乳期人群 (5) 患部范围过大（本药物无法完全覆盖患部）的患者。 (6) 老年人 2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、牙医药剂师或登录贩卖者 ＜关系部分：病征＞ 口腔内：白斑（疑似念珠菌感染）、患处出现黄色化脓（疑似细菌感染）、味觉异常、麻痹感 其他：过敏症状（出疹、发红、搔痒、浮肿等） 3. 使用本药品后，若出现下述症状，则怀疑存在因感染性疾病所致的口腔炎或其他疾病所致的口腔炎，故请中止使用，并咨询医师、口腔医师、药剂师或登录贩卖者。 发烧、食欲不振、全身倦怠感、淋巴结肿胀、水泡（除口腔内以外）、起疹、发红、发痒、本药品无法覆盖的大范围口腔内患部、眼部疼痛、视力模糊、外阴部溃疡”
添加剂	胶态烃、纤维素胶、糖精钠、香料
保管及使用注意事项	(1) 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。 (2) 保管在儿童无法触及的地方。 (3) 不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。 (4) 请勿使用超过有效期的产品。 (5) 使用后请擦拭附着于管口及周围的软膏，盖紧管盖保管。（附着的软膏可能因水分影响变硬）
其他	1、使用前请仔细洗手保持手指清洁。 2、请漱口保持口腔清洁。 3、请用纸巾或纱布等轻轻擦拭患处周围的水分或唾液。（如果患处过于干燥则软膏不容易粘着，敬请注意）

	4、第一次打开药管时，请使用管盖反面的尖端打开药管。请用纸巾或纱布等擦拭指尖的水分或唾液，在指尖上挤上药膏，用量以覆盖住患处为宜。 5、涂抹时请照镜子确保药膏覆盖于患处。涂好后请不要用舌头触碰，暂时请不要饮食。（建议餐后或睡前涂抹） 6、请用纸巾或纱布等擦干净附着于管口及周围的软膏后盖紧管盖。（软膏可能因水分的影响变硬）
生产销售公司	佐藤制药有限公司 东京都港区元赤坂 1 丁目 5 番 27 号
风险类别	指定第二类医药品
多语种产品信息的免责声明	• 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。 • 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。 • 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。 • 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任。