

의약품 구분	일반 의약품
약효 분류	구내염용 약
제품 이름	アフタガード AFTA GUARD
제품의 특징	살짝 달콤한 '연고 타입'의 구내염 치료약입니다. 구강 점막에 뛰어난 흡착력을 지녀 구내염을 제대로 보호해 줍니다. 항염증 작용이 있는 트리암시놀론 아세토니드가 환부의 염증을 가라앉혀 구내염을 개선합니다.
효능 또는 효과	구내염(애프터성)
용법 및 용량	1 일 1~수회 적당량을 환부에 바릅니다.
용법 및 용량에 관한 주의	(1)정해진 용법·용량을 준수해 주십시오. (2)어린이가 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 사용하게 할 것. (3)본제는 구강용으로만 사용하고 구강 이외에는 사용하지 마십시오. (4)통증이 가라 앉으면 사용을 종료해 주십시오. (5)사용 후에는 잠시 동안 음식을 먹거나 마시지 마십시오. (6)틀니 접착 등 치료 외의 목적으로 사용하지 마십시오.
성분 및 분량	100g 중 트리암시놀론아세토니드 : 100mg : 환부의 염증을 가라앉히고 구내염을 개선시켜 줍니다.
사용상의 주의	<p>■해서는 안 되는 것 (지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)</p> <p>1. 다음에 해당하는 사람은 사용하지 말 것 (1)감염증인 구내염이 의심되는 사람. (의사, 치과 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담해 주십시오) ●거즈 등으로 문지르면 쉽게 벗겨낼 수 있는 흰 반점이 구강내 전체에 퍼져 있는 사람. (칸디다 감염증이 의심된다) ●환부에 노란 고름이 있는 사람. (세균 감염증이 의심된다) ●구강 내에 쌀알~팥 크기의 작은 물집이 다발하고 있는 사람, 구강 점막 이외의 입술, 피부에도 물집, 발진이 있는 사람. (바이러스 감염증이 의심된다) ●발열, 식욕부진, 전신 권태감, 림프절 종창 등의 전신 증상을 보이는 사람. (바이러스 감염증이 의심된다) (2)구강 내에 감염을 동반한 사람. (스테로이드제 사용에 의해 감염증이 악화되었다는 보고가 있으므로, 치조농루, 치은염 등과 같은 구강내 감염이 있는 부위에는 사용하지 마십시오.)" (3)5 일간 사용해도 증상의 개선이 보이지 않는 사람. (4)1~2 일간 사용해도 증상의 악화를 보이는 사람.</p> <p>■ 상담할 내용 1. 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 치과 의사 약사 또는 등록판매자와 상담할 것 (1)의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람. (2)약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람. (3)임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람. (4)수유 중인 사람. (5)환부가 넓은 범위에 있는 사람. (6)고령자.</p> <p>2. 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과 의사 약사 또는 등록판매자와 상담할 것. <관계부위 : 증상> 구강내: 백반 (칸디다 감염증이 의심됨), 환부에 노란 고름 (세균 감염증이 의심됨), 미각 이상, 저린 느낌 기타: 알레르기 증상 (발진, 발적, 가려움, 부종 등)</p> <p>3. 본제 사용후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 감염증에 의한 구내염이나 다른 질환에 의한 구내염이 의심되므로, 사용을 중지하고 의사, 치과 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담해 주십시오. 발열, 식욕 부진, 전신 권태감, 림프절 종창, 수포(구강내 이외), 발진·발적, 가려움, 구강내 환부가 본제로 다 감쌀수 없을 정도로 넓은 범위로 확산, 눈의 통증, 침침한 눈, 외음부궤양</p>
첨가물	겔화탄화수소, 카르멜로스나트륨, 사카린나트륨, 향료
보관 및 취급상의 주의	(1)직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것. (2)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. (3)다른 용기에 옮겨 담지 않을 것(오용의 원인이 되거나 품질이 바뀌게 된다). (4)사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. (5)사용 후에는 튜브 입구나 그 주변에 부착된 연고를 닦은 다음 두껍을 꼭 닫아 보관해 주십시오. (부착된 연고가 수분의 영향으로 굳어버리는 경우가 있습니다.)

<p>기타</p>	<p>< AFTA GUARD 의 사용 방법 > 1,손을 잘 씻어서 손을 청결히 합니다. 2,입 안을 행귀 깨끗이 해주십시오. 3,티슈나 거즈 등으로 가볍게 누르듯 환부 주변의 수분이나 타액을 닦아 주십시오. (환부가 너무 건조하면 연고가 잘 발리지 않으므로 주의해 주십시오) 4,처음 튜브를 열 때 두껍 반대쪽의 뾰족한 부분을 사용합니다. 손가락 끝의 수분이나 타액을 티슈나 거즈 등으로 닦은 후 튜브에서 환부를 덮을 정도의 양을 손가락으로 덜어 냅니다. 5,거울 등을 보면서 환부 주변부터 덮는 듯 바릅니다. 바른 후 혀로 건들지 않도록 하고 잠시 동안은 음료나 음식은 자제합니다. (식후나 취침 전에 바르는 것이 좋습니다) 6,튜브 입구나 그 주변에 부착된 연고를 티슈나 거즈 등으로 깨끗이 닦은 다음 두껍을 꼭 닫아 보관해 주십시오. (수분의 영향으로 연고가 굳을 수 있습니다)</p>
<p>제조 판매 회사</p>	<p>사토 제약 주식회사 도쿄도 미나토 구 모토 아카사카 1 초메 5 번 27 호</p>
<p>위험 구분</p>	<p>지정제 2 류의약품</p>
<p>다국어 제품 정보에 대한 고지 사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다. • 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다. • 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다. • 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.