

藥品類別	一般用医薬品
藥效學分類	口內炎用藥
產品名稱	アフタガード AFTA GUARD
產品功能	帶有淡淡甜味的”軟膏型”口內炎治療藥。在口腔黏膜上具有優異的附着力，確實的治療口內炎。具有消炎作用的曲安奈德可鎮定患部的發炎症狀，改善口內炎。
療效或效果	口腔潰瘍（口瘡）
用法及用量	1 天 1～數次，取適量塗抹於患部。
用法及用量相關的注意事項	(1)請嚴格遵守規定的用法、用量。 (2)使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。 (3)本劑限用於口腔，請勿使用於口腔以外的部位。 (4)疼痛治癒後請停止使用。 (5)使用後請暫時避免飲食。 (6)請勿使用於治療黏合假牙等治療以外的用途。
成分及分量	100 g 中 曲安奈德：100mg：鎮定患部發炎症狀，改善口內炎。
使用上的注意事項	■禁止事項 （若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用） 1. 下列的人請勿使用 (1)懷疑為感染性疾病的口腔炎患者。（請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者） ●用紗布等擦拭後可輕易剝落的白斑擴散到口腔整體的人。（懷疑為念珠菌感染性疾病） ●患部有黃膿的人。（懷疑為細菌感染性疾病） ●口腔內多發米粒大～紅豆大小水皰的患者，口腔黏膜以外的口唇、皮膚處也有水皰、起疹的患者。（懷疑為病毒感染性疾病） ●出現發熱、食欲不振、全身倦怠感、淋巴結腫脹等全身症狀者。（懷疑為病毒感染性疾病） (2)伴隨口腔內感染的人。 （由於有因使用類固醇製劑而導致感染性疾病病情惡化的報告，故請勿用於有牙槽膿腫、牙周炎等口腔記憶體在感染的部位。） (3)即使使用 5 天也不見症狀改善的人。 (4)即使使用 1～2 天仍見症狀惡化的人。 ■諮詢事項 1. 下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙醫、藥劑師或登錄販賣者 (1)正在接受醫師或牙科醫師治療的人。 (2)曾因藥品等，引發過敏症狀的人。 (3)孕婦或可能懷孕的人。 (4)正在哺乳的人。 (5)患部範圍過大（本藥劑無法完全覆蓋患部）的患者。 (6)年長者。 2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙醫、藥劑師或登錄販賣者 ＜關係部分：病徵＞ 口腔內：白斑（疑似念珠菌感染），患部出現黃色膿液（疑似細菌感染症狀），味覺異常、麻痺 其他：過敏症狀（發疹、發紅、發癢、浮腫等） 3. 使用本藥劑後，若出現下列症狀，則懷疑存在因感染性疾病所致的口腔炎或其他疾病所致的口腔炎，故請停止使用，並諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者。 發燒、食欲不振、全身倦怠感、淋巴結腫脹、水皰（除口腔內以外）、發疹、發紅、發癢、本藥劑無法覆蓋的大範圍口腔內患部、眼睛痛、視力模糊、外陰部潰瘍
添加劑	膠凝碳氫化合物、纖維素膠、糖精、香料
保管及使用上的注意事項	(1)請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。 (2)請保管於兒童拿不到的地方。 (3)請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質）。 (4)請勿使用超過使用期限的製品。 (5)服用後將軟管口或周邊沾附的軟膏擦拭清潔後，蓋緊瓶蓋後保存。（附著的軟膏可能因潮濕而硬化）
其他	＜如何使用 AFTA GUARD＞ 1、請確實的清潔手部與指尖。 2、請漱口並保持清潔。

	3、以面紙或紗布輕輕按壓，將患部附近的水份及唾液擦拭乾淨。（患部若過於乾燥將可能使軟膏無法塗抹，請您留意） 4、一開始打開軟管時，請使用蓋上背面的尖起處。以面紙或紗布輕輕按壓，將指尖的水份及唾液擦拭乾淨，再從軟管擠出足以覆蓋患部的量於指尖上。 5、一面照鏡子一面從患部四周塗抹藥劑直到完全覆蓋。塗抹後請勿以舌頭觸碰，也暫時避免飲食。（餐後及睡前塗抹為最佳） 6、以面紙或紗布將軟管口或周邊沾附的軟膏擦拭清潔後，蓋緊瓶蓋保存。（軟膏可能因潮濕而硬化）
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂 1-5-27
風險類別	指定第二類醫藥品
多語種產品信息的免責聲明	・本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。 ・多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。 ・多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。 ・針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。