

藥品類別	一般用医薬品
藥效學分類	口內炎用藥
產品名稱	サトウ口内軟膏 SATO ORAL OINTMENT
產品功能	<ul style="list-style-type: none"> ●含有能抑制發炎的莫磺酸鈉、甘草次酸，且添加具有優異殺菌效果的西吡氯銨水合物的口內炎和舌炎的軟膏。 ●使用附著性高的基劑，因此可附著在患部，舒緩因食物刺激或接觸的疼痛。 ●莫磺酸鈉為歐洲原生種植物洋甘菊中的水溶性成份”甘菊藍”，直接作用於黏膜、抑制發炎症狀，迅速治療受傷的黏膜。
療效或效果	口腔潰瘍，舌炎
用法及用量	1天2~4次，清潔患部後取適量塗抹。
用法及用量相關的注意事項	<ol style="list-style-type: none"> (1)請嚴格遵守規定的用法、用量。 (2)使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。 (3)請勿使用於口腔以外的部位。
成分及分量	<p>莫磺酸鈉：0.02%：直接作用於黏膜，鎮定發炎，治療受傷的黏膜。</p> <p>甘草次酸：0.3%：鎮定發炎、消除腫脹。</p> <p>西吡氯銨水合物：0.1%：具有優異的殺菌作用。</p>
使用上的注意事項	<p>■諮詢事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙醫藥劑師或登錄販賣者 <ol style="list-style-type: none"> (1)正在接受醫師或牙科醫師治療的人。 (2)曾因藥品等，引發過敏症狀的人。 2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 <p style="margin-left: 20px;">〈關係部分：病徵〉</p> <p style="margin-left: 20px;">皮膚：發疹、發紅，發癢</p> 3. 即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
添加劑	維生素E、乙二胺四乙酸二鈉、聚乙二醇、聚丙烯酸酯鈉、矽酸鎂鋁、膠凝碳氫化合物、香料
保管及使用上的注意事項	<ol style="list-style-type: none"> (1)請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。 (2)請保管於兒童拿不到的地方。 (3)請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）。) (4)請勿使用超過有效期限的產品。
其他	<p><使用方法></p> <ol style="list-style-type: none"> (1)以面紙或紗布輕壓，清潔患部的唾液。 (2)以食指指尖取用軟膏，於患部塗抹薄薄的一層。 (3)視口內唾液量，藥劑約4~5分鐘內變成果凍狀以保護患部。 <p>口內炎…</p> <p>由感冒、胃腸問題、貧血、缺乏維生素B群及慢性疲勞所引起，受到口內細菌及病毒感染造成。藉由漱口保持口腔清潔，塗抹口內軟膏保護患部。此外，補充維生素B2、B6具有加速癒合的作用。</p>
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂1-5-27
風險類別	3類藥品
多語種產品信息的免責聲明	<ul style="list-style-type: none"> ・本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。 ・多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。 ・多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。 ・針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。