

藥品類別	一般用醫藥類
藥效學分類	外用消炎鎮痛藥
產品名稱	サロメチール SALOMETHYL
產品功能	手腳或腰部疲倦會引起血液循環或新陳代謝的異常，帶來疼痛及僵硬感。 ●擦勞滅（Salomethyl）為高效的滲透性軟膏。 ●擦勞滅（Salomethyl）擦拭於患部，經皮膚吸收後可有效舒緩發炎症狀或疼痛，運動前後的肌肉疲勞、撞傷、扭傷、肩膀僵硬、關節炎等。
療效或效果	運動前後的肌肉疲勞、撞傷、扭傷、頭痛、牙痛、肩頸僵硬、凍傷、風溼、神經痛、關節炎、毒蟲咬傷、皮膚騷癢、咽喉痛、感冒性關節炎
用法及用量	1 天數次，取適量塗抹於患部。
用法及用量相關的注意事項	- 請嚴格遵守規定的用法、用量。 - 使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。 - 請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗。此外，症狀嚴重的情況下，請接受眼科醫師的診療。 - 沾附本藥劑的手請勿接觸眼睛等黏膜部位。 - 請只使用於外用。 - 用於撞傷、扭傷等急性症狀時，請消腫後再使用。 - 本藥劑若附著在手錶、眼鏡等金屬類、化學纖維衣物、塑膠製品類、塗層地板、家具等上可能產生變質，請注意勿使藥劑附著其上。 - 附著在衣物上時，請盡速以清水或清潔劑沖洗。 - 皮膚敏感的人請勿持續塗抹在同一個部位。 - 請避免在洗澡前後使用。 - 請勿以暖桌或電熱毯等物品溫熱已塗抹藥劑的患部。 - 洗澡時摩擦肌膚，夏季流汗等，可能因本藥劑感覺到強烈的刺激。 若感覺強烈疼痛、刺激感或發癢時，請停止使用，並以香皂充分起泡後，以不摩擦的方式輕輕地沖洗患部數次，將患部以冷水或擰乾毛巾等冷敷。若症狀仍未見改善，請持本文件向醫師諮詢。
成分及分量	1g 中 水楊酸甲酯：190mg：容易從皮膚吸收，改善患部血液循環、提高新陳代謝，緩解因肌肉疲勞或挫傷、扭傷等帶來的發炎症狀疼痛。 乙二醇水楊酸酯：10mg：容易從皮膚吸收，改善患部血液循環、提高新陳代謝，緩解因肌肉疲勞或挫傷、扭傷等帶來的發炎症狀疼痛。 d1-樟腦：70mg：針對知物神經末梢作用，緩解肌肉疲勞或挫傷、扭傷等帶來的疼痛。 左旋薄荷：60mg：針對知物神經末梢作用，緩解肌肉疲勞或挫傷、扭傷等帶來的疼痛。 辣椒素：0.25mg：溫和的局部溫感刺激作用，擴張局部血管，改善血液循環，有效緩解疲勞或肩膀僵硬。 菸酸苄酯：0.2mg：溫和的局部溫感刺激作用，擴張局部血管，改善血液循環，有效緩解疲勞或肩膀僵硬。 尤加利油：10mg：具有芳香的清涼感，有止癢的效果。 百里酚：10mg：具有殺菌作用。
使用上的注意事項	■禁止事項 （若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用） 請勿使用於下列部位：眼睛周圍、黏膜等、濕疹、斑疹、傷口。 ■諮詢事項 - 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。 - 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 皮膚：發疹・發紅、發癢、疼痛 - 即使服用 5～6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
添加劑	十八烷醇、硬脂酸、十四酸異丙酯、氫氧化鈉、三乙醇胺、聚氧乙烯失水蜂蠟、乙氧基化氫化蓖麻油
保管及使用上的注意事項	- 請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。 - 請保管於兒童拿不到的地方。 - 請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。。） - 請勿使用超過有效期限的產品。
其他	
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂 1-5-27
風險類別	3 類藥品
多語種產品信息的免責聲明	・本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">・多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。・多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。・針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。 |
|--|---|