

药品类别	一般用医药品
药效分类	感冒药
产品名称	ストナジェルサイナス EX STONA GEL SINUS EX
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> ●这是一种感冒药，其中含有颠茄总生物碱，盐酸二苯基吡喃啉，对感冒的流鼻涕有极好的效果。 ●对乙酰氨基酚具有退烧功效，可缓解头痛等痛楚。 ●本品为容易服用的软胶囊，胶囊内含物为液体。
效能或效果	缓解各类感冒症状(鼻涕、鼻塞、喷嚏，咽喉疼痛、咳嗽、咳痰、恶寒、发烧、头疼、关节痛、肌肉疼痛)
用法及用量	<p>尽量在餐后 30 分钟内服用。1 次服用量如下所示。</p> <p><年龄：1 次服用量：1 天服用次数></p> <p>成人（15 岁以上）：2 粒：3 次</p> <p>未满 15 周岁：请勿服用</p>
用法及用量相关注意	<p>(1)请严格遵守规定的用法、用量使用。</p> <p>(2)胶囊取出方式</p> <p>请用手指用力按压装入胶囊的 PTP 包装的凸起部，压破反面的铝箔后取出胶囊服用。</p> <p>(如果不不小心误吞铝箔，可能发生铝箔卡在食道粘膜等意外事故，敬请注意。)</p>
成分及分量	<p>每 6 胶囊中</p> <p>颠茄总生物碱：0.6mg：作用于副交感神经，可缓解流鼻涕症状。</p> <p>盐酸二苯拉林：4mg：可缓解流鼻涕、鼻塞、打喷嚏等症状。</p> <p>对乙酰氨基酚：900mg：有效缓解发烧、发冷、头痛、咽喉疼痛、全身疼痛等症状。</p> <p>d1-盐酸甲基麻黄碱：60mg：可缓解咳嗽症状。</p> <p>双氢可待因磷酸盐：24mg：可缓解咳嗽症状。</p> <p>那可丁：48mg：可缓解咳嗽症状。</p> <p>盐酸氨溴索：45mg：轻松排出痰液。</p> <p>无水咖啡因：75mg：增强解热镇痛成分的功效。</p> <p>核黄素：12mg：补充感冒时容易缺乏的维生素。</p> <p><成分及分量相关注意></p> <p>由于本品中含有核黄素(维生素 B2)，服用后尿液可能变黄。</p>
使用注意事项	<p>■禁止事项</p> <p>(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故)</p> <p>1. 下述人群不要服用</p> <p>(1)曾因本品或本品所含成分引起过过敏症状的人</p> <p>(2)因服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药而引发过哮喘的人群</p> <p>(3)未满 15 岁的儿童</p> <p>2. 在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品</p> <p>其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）、肠胃镇痛镇痉药</p> <p>3. 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类（会出现嗜睡、视线模糊、异常眩光等症状）</p> <p>4. 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳</p> <p>5. 服用前后不要饮酒</p> <p>6. 不要长期连续服用</p> <p>■咨询事项</p> <p>1. 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者</p> <p>(1)正在接受医师或牙科医师治疗的人群</p> <p>(2)孕妇或有其可能性的人群</p> <p>(3)老年人</p> <p>(4)因药物等出现过过敏症状的人群</p> <p>(5)拥有以下症状的人群</p> <p>高烧，排尿困难</p> <p>(6)接受以下诊断的人群</p> <p>甲状腺功能障碍，糖尿病，心脏病，高血压，肝脏病，肾脏病，胃及十二指肠溃疡，青光眼，呼吸功能障碍，阻塞性睡眠呼吸暂停综合症，肥胖症</p> <p>2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者</p> <p><关系部分：病征></p> <p>皮肤：起疹、发红，发痒</p> <p>消化系统：恶心、呕吐，食欲不振、胃部不适、胃痛、腹痛、胃和腹部丰满、烧心、腹泻</p> <p>精神神经系统：头晕，头痛、麻木</p>

	<p>泌尿系统：排尿困难 其他：体温过低，脸部灼热，异常眩光、浮肿</p> <p>偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。</p> <p><症状名称，病征></p> <p>休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。 史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。 肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。 肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。 间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。 哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。 呼吸抑制：出现气短、呼吸困难等症状。</p> <p>3. 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者 便秘，口腔干燥，嗜睡，视线模糊</p> <p>4. 若服用 5~6 次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者</p>
添加剂	十二烷基硫酸钠，聚山梨醇酯 80，丙二醇脂肪酸酯，甘油脂肪酸酯，明胶，琥珀酸明胶，甘油，D-山梨糖醇，氧化钛，对羟基苯甲酸酯
保管及使用注意事项	<p>(1) 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所。</p> <p>(2) 保管在儿童无法触及的地方。</p> <p>(3) 不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。</p> <p>(4) 请勿服用超过有效期的产品。</p>
其他	<p><迅速康复的建议></p> <p>1. 请保证充足的睡眠，不要勉强是治疗的第一步。尤其在发烧和咳嗽时，请尽可能不要工作或做家务，请卧床休息。</p> <p>2. 请使用保暖的衣物和被褥。房间保暖也很重要，请尽可能给房间加湿，防止空气干燥。</p> <p>3. 出汗后用毛巾擦拭，并且勤换内衣，注意不要让身体着凉。退烧后也请忍耐 1-2 天不要泡澡。</p> <p>4. 请尽可能吃热餐、水分及维生素丰富的食物、高热量食物和容易消化的食物。</p>
生产销售公司	佐藤制药有限公司 东京都港区元赤坂 1 丁目 5 番 27 号
风险类别	指定第二类医药品
多语种产品信息的免责声明	<ul style="list-style-type: none"> · 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。 · 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。 · 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。 · 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任。