

藥品類別	一般用醫藥類
藥效學分類	感冒藥
產品名稱	ストナジェルサイナス EX STONA GEL SINUS EX
產品功能	<ul style="list-style-type: none"> ●這是一種感冒藥，其中含有顛茄總生物鹼，鹽酸二苯基吡喃，對感冒的流鼻涕有極好的效果。 ●對乙酰氨基酚具有退燒、緩和頭痛等疼痛之效。 ●容易服用的軟膠囊內為液體。
療效或效果	緩和感冒的各項症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、咳嗽、生痰、惡寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉疼痛）
用法及用量	<p>請盡量在飯後 30 分鐘以內，服用下述的 1 次服用量。</p> <p><年齡：1 次服用量：1 天服用次數> 成人（15 歲以上）：2 粒膠囊：3 次 未滿 15 周歲：請勿服用</p>
用法及用量相關的注意事項	<p>(1)請嚴格遵守規定的用法、用量。</p> <p>(2)膠囊取出方式 將包覆錠劑的 PTP 凸起部分以指腹向下擠壓，內部鋁箔破開後取出藥劑服用。 （若不小心誤食可能造成刺穿食道黏膜等意外事故。）</p>
成分及分量	<p>每 6 膠囊</p> <p>顛茄總生物鹼：0.6mg：有效控制副交感神經，可抑制鼻水。 鹽酸二苯拉林：4mg：可抑制打噴嚏、鼻水、鼻塞等症狀。 對乙酰氨基酚：900mg：對發燒、畏寒、頭痛、喉嚨痛、全身酸痛有效。 d1-鹽酸甲基麻黃鹼：60mg：緩解咳嗽症狀。 雙氫可待因磷酸鹽：24mg：緩解咳嗽症狀。 諾斯卡品：48mg：緩解咳嗽症狀。 鹽酸氨溴索：45mg：輕鬆排出痰液。 無水咖啡因：75mg：可提高解熱、鎮痛成分的效果。 核黃素：12mg：補充感冒時常缺乏的維生素。</p> <p><成分及分量相關的注意事項> 由於本藥劑含有核黃素（維生素 B2），因此服用本劑時尿液會呈現偏黃色。</p>
使用上的注意事項	<p>■禁止事項 （若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 下列的人請勿服用 <ol style="list-style-type: none"> (1)曾因本藥劑或本藥劑的成份引起過敏症狀的人。 (2)曾服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥，引發氣喘的人。 (3)未滿 15 歲的兒童。 2. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。 其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）、胃腸鎮痛鎮痙藥 3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。） 4. 正在哺乳的人請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳 5. 服用前後，請勿飲酒 6. 請勿長期連續服用 <p>■諮詢事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 <ol style="list-style-type: none"> (1)正在接受醫師或牙科醫師治療的人。 (2)孕婦或可能懷孕的人。 (3)年長者。 (4)曾因藥品等，引發過敏症狀的人。 (5)有下列症狀的人。 發高燒，排尿困難 (6)接受過下列診斷的人。 甲狀腺功能障礙，糖尿病，心臟病，高血壓，肝臟病，腎臟病，胃潰瘍，十二指腸潰瘍，青光眼，呼吸功能障礙，阻塞性睡眠呼吸中止症，肥胖症 2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者 <關係部分：病徵> 皮膚：發疹、發紅，發癢 消化器官：噁心、嘔吐，食欲不振、胃部不適感、胃痛、腹痛、胃和腹部豐滿、胸口灼熱、腹瀉 精神神經系統：頭暈，頭痛、麻木

	<p>泌尿器官：排尿困難 其他：過度的體溫低下，臉發燙，異常目眩、浮腫</p> <p>極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。</p> <p><症狀名稱：病徵></p> <p>休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。 史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅等持續，或者突然惡化。 肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。 腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。 間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。 氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。 呼吸抑制：出現呼吸急促、呼吸困難等。</p> <p>3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 便秘，口乾，嗜睡，視力模糊</p> <p>4. 即使服用 5~6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p>
添加劑	十二烷基硫酸鈉，聚山梨醇酯 80，丙二醇脂肪酸酯，甘油脂肪酸酯，明膠，琥珀酸明膠，甘油，D-山梨糖醇，氧化鈦，對羥基苯甲酸酯
保管及使用上的注意事項	<p>(1)請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。</p> <p>(2)請保管於兒童拿不到的地方。</p> <p>(3)請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）。</p> <p>(4)請勿使用超過有效期限的產品。</p>
其他	<p><迅速康復的建議></p> <p>1. 睡眠充足不過度勞累，是治療的第一要件。尤其是在發燒時、出現咳嗽症狀時，盡可能不工作或做家事，躺在床上休息。</p> <p>2. 添加衣物或寢具以保持身體溫暖。當然，室內也需保持溫暖，盡可能使水氣流動以防止空氣燥。</p> <p>3. 流汗時以毛巾擦拭、更換內衣，注意勿讓身體受寒。即使已退燒，也盡可能在 1~2 天內勿泡澡。</p> <p>4. 飲食方面，多攝取溫熱食物、水分或維生素較高的食物、卡路里較高的食物，或容易消化的食物。</p>
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂 1-5-27
風險類別	指定第二類醫藥品
多語種產品信息的免責聲明	<ul style="list-style-type: none"> ・本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。 ・多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。 ・多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。 ・針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。