** 1 ** 11	一般用医药品
药品类别	
药效分类	鼻炎用滴鼻液
产品名称	ナザール「スプレー」ポンプ NAZAL「SPRAY」PUMP
产品特点	●雾状的微细粒子遍布整个鼻腔,有效缓解鼻塞、流鼻涕等症状。●盐酸奈甲唑啉可促使鼻腔内血管收缩,缓解鼻粘膜充血及炎症,使鼻子呼吸畅顺。●马来酸氯苯那敏可有效抑制鼻腔内的过敏反应。●本品为能够喷射出定量药液的喷雾。喷出的液体不会倒流回容器内,卫生清洁。
效能或效果	过敏性鼻炎、缓解因急性鼻炎或副鼻窦炎引起的下述各症状:鼻塞、鼻涕(鼻涕过多)、打喷嚏、头重(头部沉重)
用法及用量	〈年龄: 1 次服用量: 1 天服用次数〉成人(15 岁以上):每次喷 1-2 下,每天向鼻腔内喷射喷雾最多不能超过 6 次。另外,请间隔 3 小时以上使用。7-14 岁:每次喷 1-2 下,每天向鼻腔内喷射喷雾最多不能超过 6 次。另外,请间隔 3 小时以上使用。未满 7 周岁:请勿服用
用法及用量相关注意	(1) 请严格遵守规定的用法、用量使用。 (2) 若过度使用反而会引起鼻塞。 (3) 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。 (4) 仅限用于滴鼻。
成分及分量	每 100mL 中 盐酸萘唑啉 : 50 mg: 可促使鼻腔内血管收缩,缓解鼻粘膜充血及炎症,改善鼻塞症状。 氯苯那敏马来酸盐: 500 mg: 可缓解因过敏反应引起的鼻塞、流鼻涕等症状。 苯扎氯铵: 10mg: 通过杀菌作用缓解鼻粘膜的炎症。
使用注意事项	 ■禁止事项 (若不遵守则会导致当前病情恶化,或容易出现副作用) 不要长期连续服用 ■咨询事项 1. 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售商。 (1)正在接受医师治疗的人群 (2)孕妇或有其可能性的人群 (3)因药物等出现过过敏症状的人群 (4)接受以下诊断的人群高血压、心脏病、糖尿病、甲状腺功能障碍、青光眼 2. 使用后若出现下述症状,则可能存在副作用,此时应立即中止使用,并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者 〈关系部分:病征〉皮肤:起疹、发红,发痒鼻子:红肿,刺激感 3. 若使用3天后症状仍无改善则应中止使用,并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者 聚二甲基硅氧烷、二氧化硅、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、柠檬酸、氯化钠、香料(含苯乙醇、苯甲醇、聚山梨醇酯-20)
添加剂 保管及使用注意事项	(1)保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。 (2)保管在儿童无法触及的地方。 (3)不要移至其他容器中(会导致误用或变质)。 (4)不要与他人共用。
其他	(5)请勿服用超过有效期的产品。 <使用方法> 打开容器项部的盖子。 将容器的项端朝上,按数次直至药液形成雾状喷出。 请擤干净鼻涕使鼻腔通气后,将容器垂直伸入鼻腔内,一边缓缓吸气一边喷射喷雾。 使用后请用纸巾等擦拭喷嘴,盖上瓶盖。 <使用注意事项> 1. 使用前请先擤干净鼻涕,使鼻腔通气后再使用。 2. 初次使用时,请先按压数次直至药液喷出。 3. 将容器横放使用会导致药液无法形成雾状,请必须将容器朝上使用。 4. 请勿用针等尖锐物品插入喷嘴尖端,如果喷嘴折断会非常危险。 5. 使用后请用纸巾等擦拭喷嘴,保持清洁。
生产销售公司	佐藤制药有限公司 东京都港区元赤坂1丁目5番27号

多语种产品信息的免责 声明

- ·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的,基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- ·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的,仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方(或本公司)临时翻译而成,未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- ·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题,提供方(或本公司)概不承担一切责任。