

의약품 구분	일반 의약품
약효 분류	비염용 점비약
제품 이름	ナザール「スプレー」ポンプ NAZAL「SPRAY」PUMP
제품의 특징	<ul style="list-style-type: none"> ●미스트 타입의 미세한 입자가 비강 내에 고루 닿아 코막힘, 콧물에 효과를 나타냅니다. ●나파졸린염산염 작용으로 비강 내의 혈관을 수축시키고 울혈이나 염증을 억제해 코 뚫림을 좋게 합니다. ●클로르페니라민말레산염의 작용으로 비강 내의 알레르기 증상을 억제하고 효과를 나타냅니다. ●일정량의 약액을 분무할 수 있는 스프레이입니다. 한번 분무된 약액은 용기 내로 역류되지 않아서 위생적입니다.
효능 또는 효과	알레르기성 비염, 급성 비염 이나 부비동염으로 인한 다음 증상의 완화: 코막힘, 콧물(콧물 과다), 재채기, 두증
용법 및 용량	<p><연령: 1회 복용량: 1일 복용 횟수></p> <p>어른 (15 세 이상): 1~2 회: 6 번에 한해 비강 내에 분무해 주십시오. 또한, 사용 간격은 3 시간 이상 두시기 바랍니다.</p> <p>7~14 세: 1~2 회: 6 번에 한해 비강 내에 분무해 주십시오. 또한 사용 간격은 3 시간 이상 두시기 바랍니다.</p> <p>7 세 미만: 복용하지 마십시오</p>
용법 및 용량에 관한 주의	<p>(1)정해진 용법·용량을 준수해 주십시오.</p> <p>(2)과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있다.</p> <p>(3)어린이가 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 사용하게 할 것.</p> <p>(4)점비용으로만 사용할 것.</p>
성분 및 분량	<p>100mL 중</p> <p>나파졸린염산염 : 50 mg : 작용에 의한 목의 통증, 부기를 억제합니다.</p> <p>클로르페니라민말레산염 : 500 mg : 환부를 살균합니다</p> <p>벤잘코늄염화물 : 10 mg : 살균작용으로 살균에 의한 코 점막의 염증을 가라앉혀 줍니다.</p>
사용상의 주의	<p>■해서는 안 되는 것 (지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다) 장기간 연용하지 않을 것</p> <p>■상담할 내용</p> <p>1 . 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담해 주십시오</p> <p>(1)의사의 치료를 받고 있는 사람.</p> <p>(2)임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.</p> <p>(3)약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.</p> <p>(4)다음의 진단을 받은 사람. 고혈압, 심장병, 당뇨병, 갑상선 기능 장애, 녹내장</p> <p>2 . 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.</p> <p><관계부위 : 증상></p> <p>피부:발진·발적,가려움</p> <p>코:부음, 자극감</p> <p>3 . 3 일 정도 사용 후에도 증상이 나아지지 않으면 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것</p>
첨가물	디메틸폴리실록산, 이산화규소, 인산이수소칼륨, 인산수소이칼륨, 구연산, 염화나트륨, 향료 (페닐에틸알코올, 벤질알코올, 폴리소르베이트 20 함유)
보관 및 취급상의 주의	<p>(1)직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.</p> <p>(2)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.</p> <p>(3)다른 용기에 옮겨 담지 않을 것(오용의 원인이 되거나 품질이 바뀌게 된다).</p> <p>(4)다른 사람과 공유하지 않을 것.</p> <p>(5)사용 기한이 지난 제품은 복용 하지 마십시오.</p>
기타	<p>< 사용 방법 ></p> <p>뚜껑을 엽니다.</p> <p>용기의 끝부분이 위쪽을 향하도록 들고 약액이 미스트 타입으로 나올 때까지 몇 번 눌러 주십시오.</p> <p>코를 풀어 코 뚫림을 좋게 한 후 용기를 수직으로 비강 내에 넣고 가볍게 숨을 쉬면서 분무해 주십시오.</p> <p>사용 후에는 노즐을 티슈 등으로 닦은 후 뚜껑을 닫아 주십시오.</p> <p>< 사용상의주의 ></p> <p>1. 사용 전에는 코를 풀어 비강의 뚫림을 좋게 해두십시오.</p> <p>2. 처음 사용할 때는 약이 나올 때까지 몇번 눌러 주십시오.</p> <p>3. 용기를 누어서 사용하면 약액이 미스트 상태가 되지 않으므로 반드시 수직으로 세워서 사용해 주십시오.</p> <p>4. 노즐 끝을 바늘 등으로 찌르면 부러졌을 경우 위험하므로 삼가 주십시오.</p> <p>5. 사용 후에는 노즐을 티슈 등으로 닦아 청결히 보관해 주십시오.</p>

제조 판매 회사	사토 제약 주식회사 도쿄도 미나토 구 모토 아카사카 1 초메 5 번 27 호
위험 구분	제 2 류 의약품
다국어 제품 정보에 대한 고지 사항	<ul style="list-style-type: none"> · 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다. · 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다. · 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다. · 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.