

藥品類別	一般用医薬品
藥效學分類	鼻炎用點鼻藥
產品名稱	ナザール「スプレー」ポンプ NAZAL「SPRAY」PUMP
產品功能	<ul style="list-style-type: none"> ●霧狀的細微粒子遍佈在鼻腔內，能有效改善鼻塞、鼻水。 ●奈甲啞啞啞氫氯化物能使鼻腔內血管收縮，抑制瘀血或發炎症狀，使鼻子通暢。 ●其鹽類馬來酸氯苯那敏對於抑制鼻腔內的過敏症狀有效。 ●可噴灑定量藥液的噴霧劑。一經噴灑的藥液不會回流回容器內，較為衛生。
療效或效果	過敏性鼻炎、緩和因急性鼻炎或副鼻腔炎的下列各項症狀：鼻塞、流鼻水（鼻水過多）、打噴嚏、頭重（頭沉）。
用法及用量	<p><年齡：1次使用量：1天使用次數></p> <p>大人（15歲以上）：1～2次：噴灑於鼻腔內，最多6次。此外，每次使用請間隔3小時以上。</p> <p>7～14歲：1～2次：噴灑於鼻腔內，最多6次。此外，每次使用請間隔3小時以上。</p> <p>未滿7周歲：請勿服用</p>
用法及用量相關的注意事項	<p>(1)請嚴格遵守規定的用法、用量。</p> <p>(2)若是過度使用，可能反而引發鼻塞。</p> <p>(3)使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。</p> <p>(4)請只使用於點鼻。</p>
成分及分量	<p>100mL 中</p> <p>鹽酸萘啞啞：50 mg：改善鼻腔內血管收縮、瘀血、抑制發炎、鼻塞。</p> <p>氯苯那敏馬來酸鹽：500 mg：舒緩因過敏產生的鼻塞、流鼻水症狀。</p> <p>苯扎氯銨：10mg：具殺菌作用，抑制因殺菌產生的鼻黏膜發炎。</p>
使用上的注意事項	<p>■禁止事項</p> <p>（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）</p> <p>請勿長期連續服用</p> <p>■諮詢事項</p> <p>1. 以下人員在使用前請諮詢醫師、牙醫、藥劑師或註冊銷售商。</p> <p>(1)正在接受醫師治療的人。</p> <p>(2)孕婦或可能懷孕的人。</p> <p>(3)曾因藥品等，引發過敏症狀的人。</p> <p>2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p> <p><關係部分：病徵></p> <p>皮膚：發疹、發紅，發癢，腫脹</p> <p>鼻子：腫脹，刺激感</p> <p>3. 即使使用3天左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p>
添加劑	二甲聚矽氧烷、二氧化矽、磷酸二氫鉀、磷酸氫二鉀、檸檬酸、氯化鈉、香料（含苯乙醇、苯甲醇、聚山梨醇酯20）
其他	<p><使用方法></p> <p>取下頭蓋。</p> <p>請將容器前端朝上，先按壓數次直到藥液呈霧狀噴灑為止。</p> <p>請先擤鼻涕並保持鼻腔通暢，將容器直接放入鼻腔內，慢慢地一面吸氣一面按壓噴灑。</p> <p>使用後噴嘴以面紙擦拭乾淨，蓋上瓶蓋。</p> <p><使用注意事項></p> <p>1. 使用前請先擤鼻涕並保持鼻腔通暢。</p> <p>2. 第一次使用時，請先按壓數次，直到藥液噴灑為止。</p> <p>3. 容器橫放使用時藥液將無法霧化，因此請務必垂直使用。</p> <p>4. 請勿以針類物品刺穿噴嘴前端，若折斷將非常危險。</p> <p>5. 使用後噴嘴以面紙擦拭乾淨，保持清潔。</p>
保管及使用上的注意事項	<p>(1)請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。</p> <p>(2)請保管於兒童拿不到的地方。</p> <p>(3)請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）。</p> <p>(4)請勿與他人共用。</p> <p>(5)請勿使用超過有效期限的產品。</p>
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂1-5-27
風險類別	2類藥品
多語種產品信息的免責聲明	・本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。・多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。・針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。 |
|---|