

药品类别	一般用医药品
药效分类	鼻炎用滴鼻液
产品名称	ナザールαAR0.1% NAZALαAR0.1%<FOR RHINITIS FROM SEASONAL ALLERGIES>
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>●丙酸倍氯米松可促使鼻腔内血管收缩，缓解鼻粘膜充血及炎症，使鼻子呼吸顺畅。</li> <li>●本品为能够喷射出定量药液的喷雾。喷出的液体不会倒流回容器内，卫生清洁。</li> </ul>
效能或效果	缓解花粉所致季节性过敏的下列症状：鼻塞、鼻涕（鼻涕过多）、打喷嚏
用法及用量	<p>一般情况下，请按照以下用量向鼻腔内喷射喷雾。</p> <p>[年龄：单次使用量：每天使用次数] 成人（18岁以上）：向左右鼻腔内各喷1下：2次（早、晚） 18岁以下：请勿使用</p> <p>每天最多可使用4次（喷8下），但请间隔3小时以上使用。 ●症状有所改善后请减少使用次数。如果症状再次恶化，可增加使用次数。 ●一年的使用时间请勿超过3个月。</p>
用法及用量相关注意	<p>(1)由于本药品含丙酸倍氯米松（类固醇），过量使用或使用方法错误时可能易于引起副作用，故请严格遵守规定的用法、用量使用。</p> <p>(2)仅限用于滴鼻。</p> <p>(3)使用时若感觉有味道，请漱口。</p>
成分及分量	<p>每100g中 丙酸倍氯米松：0.1g</p>
使用注意事项	<p>■禁止事项 （若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）</p> <p>1. 下述人群不要使用</p> <p>(1)接受以下诊断的人群 全身性真菌感染，结核性疾病，高血压，糖尿病，反复鼻出血，哮喘，青光眼，感染性疾病</p> <p>(2)鼻孔化脓（因毛根处感染而积脓，伴有疼痛或肿胀）者</p> <p>(3)曾因本药品或丙酸倍氯米松制剂而引起过敏症状者</p> <p>(4)未满18岁的者</p> <p>(5)孕妇或有其可能性的人群</p> <p>(6)在过去1年中使用类固醇滴鼻剂超过3个月者</p> <p>2. 请勿使用本药品或其他类固醇类滴鼻剂合计在1年中超过3个月（如果您需要使用超过3个月，请咨询耳鼻喉科医生，因为可能还会存在其他疾病。）</p> <p>3. 使用本药品后请勿使用类固醇类滴鼻剂。当若是医师所开具时，请遵医嘱</p> <p>■咨询事项</p> <p>1. 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售商。</p> <p>(1)正在接受医师治疗的人群</p> <p>(2)正在接受脱敏疗法等过敏治疗者</p> <p>(3)头部、额头或面颊等有疼痛，有黄色或绿色等鼻涕者（感染副鼻窦炎）</p> <p>(4)哺乳期人群</p> <p>(5)因药物等出现过过敏症状的人群</p> <p>(6)无法清晰分辨是季节性过敏所致症状还是其他原因所致症状者。</p> <p>(7)老年人</p> <p>(8)肥厚性鼻炎*1或鼻息肉*2患者。 *1：鼻塞严重，少量粘液性或者黄色或绿色鼻涕流出。 *2：鼻塞，有鼻声、鼻腔深部有异物感等。</p> <p>(9)正在接受长期或大剂量全身性类固醇疗法者。</p> <p>2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者</p> <p>&lt;关系部分：病征&gt;</p> <p>鼻：流鼻血、鼻腔内的疮痂、刺激感、瘙痒、干燥感、不适、打喷嚏、嗅觉异常、化脓症状（因毛根感染导致化脓并伴有疼痛及红肿）</p> <p>喉咙：刺激感、异物感、化脓症状（因感染导致喉咙深处出现白色脓肿并伴有疼痛及红肿）”</p> <p>皮肤：起疹、发红，发痒，红肿</p> <p>精神神经系统：头痛，头晕</p> <p>消化系统：恶心、呕吐，腹泻，食欲不振</p>

	<p>其他：哮喘发作，眼睛疼痛，视线模糊，心悸，血压上升</p> <p>偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。</p> <p>&lt;症状名称，病征&gt;</p> <p>休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。</p> <p>3. 使服用后如头部、额头或面颊等出现疼痛，有黄色或绿色等鼻涕，出现异于往常的症状时，请立即停止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者（可能并发其他疾病。）</p> <p>4. 若使用 1 周后(1 日最多可以使用 4 次（8 喷）)症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者</p>
添加剂	纤维素、羧甲基纤维素钠、丙二醇、甘油、聚山梨醇酯-80、苯扎氯铵、柠檬酸、香料（含 L-薄荷醇）
保管及使用注意事项	<p>(1) 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。</p> <p>(2) 保管在儿童无法触及的地方。</p> <p>(3) 不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。</p> <p>(4) 不要与他人共用。</p> <p>(5) 请勿服用超过有效期的产品。即使尚未超出使用期限，开封后也请尽量早日使用。</p>
其他	<p>&lt;使用方法&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鼻腔化脓的人请勿使用。</li> <li>2. 使用前请先擤干净鼻涕。擤鼻涕请勿过度。</li> <li>3. 请轻摇容器，打开盖子，如图所示拿着容器。（最初开始使用时请先空按几次直至药液呈雾状喷出）</li> <li>4. 将喷嘴的尖端轻轻放入鼻腔内，每次喷一下。另一边的鼻腔也请重复相同操作。</li> <li>5. 使用后，为了保持容器清洁，请擦拭与鼻腔接触的部分后盖上盖子。</li> </ol> <p>&lt;使用注意事项&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前请先擤干净鼻涕，使鼻腔通气后再使用。</li> <li>2. 使用前请轻摇容器，打开盖子。</li> <li>3. 将容器横放使用会导致药液无法形成雾状，请务必将容器垂直使用。</li> <li>4. 喷嘴如果触碰到鼻涕等会导致药液污染或浑浊，敬请注意。</li> <li>5. 请不要将喷嘴朝鼻中隔喷射，请垂直放入鼻腔内喷射。尤其是右撇子的人容易朝右侧鼻中隔、左撇子的人容易朝左侧鼻中隔喷射，敬请注意。注：鼻中隔指位于鼻腔正中部位的分隔两侧鼻腔的隔板</li> <li>6. 使用后请用纸巾等擦拭喷嘴，保持清洁。</li> <li>7. 请勿用针等尖锐物品插入喷嘴尖端，如果喷嘴折断会非常危险。</li> </ol>
生产销售公司	佐藤制药有限公司 东京都港区元赤坂 1 丁目 5 番 27 号
风险类别	指定第二类医药品
多语种产品信息的免责声明	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。</li> <li>· 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。</li> <li>· 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。</li> <li>· 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任。</li> </ul>