

藥品類別	一般用医薬品
藥效學分類	鼻炎用點鼻藥
產品名稱	ナザールαAR0.1%<季節性アレルギー専用>NAZALαAR0.1%<FOR RHINITIS FROM SEASONAL ALLERGIES>
產品功能	●吸入性類固醇能抑制鼻腔內瘀血或發炎症狀，使鼻子通暢。 ●可噴灑定量藥液的噴霧劑。一經噴灑的藥液不會回流回容器內，較為衛生。
療效或效果	緩和下列花粉導致的季節性過敏症狀：鼻塞、流鼻水（鼻水過多）、打噴嚏。
用法及用量	一般請依照下述用量噴灑於鼻腔內部。  [年齡：1次使用量：1天使用次數] 成人（18歲以上）：左右鼻腔內各按壓噴灑1下：2次（早/晚） 18歲以下：請勿使用  1天最多可使用4次（按壓8下），但每次使用需間隔3小時以上。 ●症狀獲得改善時請減少使用次數。若症狀再度惡化，可增加使用次數。 ●1年請勿使用超過3個月。
用法及用量相關的注意事項	(1)由於本藥劑含丙酸倍氯米松（類固醇），過量使用或使用方法錯誤時可能會容易引發副作用，故請嚴格遵守規定的用法、用量使用。 (2)請只使用於點鼻。 (3)使用時若感覺有味道，請漱口。
成分及分量	100g 中 丙酸倍氯米松：0.1g
使用上的注意事項	<p>■禁止事項 （若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）</p> <p>1. 下列的人請勿使用</p> <p>(1)接受過下列診斷的人。 全身性真菌病，結核性疾病，高血壓，糖尿病，反復鼻出血，氣喘，青光眼，感染症</p> <p>(2)鼻孔化膿（因毛根處感染而積膿，伴隨疼痛和腫脹）的人</p> <p>(3)曾因本藥劑或丙酸倍氯米松製劑引發過敏症狀的人</p> <p>(4)未滿18歲的人。</p> <p>(5)孕婦或可能懷孕的人。</p> <p>(6)在過去1年中使用類固醇鼻噴劑超過3個月以上的人</p> <p>2. 本藥劑和其他類固醇鼻噴劑，請勿在1年中使用合計超過3個月（如果您需要使用超過3個月，請諮詢耳鼻喉科醫生，因為可能還會存在其他疾病。）</p> <p>3. 使用本藥劑後請勿使用類固醇鼻噴劑。但，若是由醫師開立處方時，請遵照醫囑</p> <p>■諮詢事項</p> <p>1. 以下人員在使用前請諮詢醫師、牙醫、藥劑師或註冊銷售商。</p> <p>(1)正在接受醫師治療的人。</p> <p>(2)正在接受脫敏療法等過敏治療的人。</p> <p>(3)頭部、額頭和臉頰等感到疼痛，有黃色和綠色等鼻涕的人（感染副鼻腔炎）</p> <p>(4)正在哺乳的人</p> <p>(5)曾因藥品等，引發過敏症狀的人。</p> <p>(6)不確定是季節性過敏所致症狀，或其他原因所致症狀的人</p> <p>(7)年長者</p> <p>(8)患有肥厚性鼻炎*1 或鼻息肉*2 的人。 *1：鼻塞嚴重、少量黏液性或黃色和綠色的鼻涕流出。 *2：鼻塞、有鼻音、鼻腔深處有異物感等。</p> <p>(9)正在接受長期或大劑量全身性類固醇療法的人</p> <p>2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>&lt;關係部分：病徵&gt;</p> <p>鼻：鼻子出血、鼻內結痂、刺激感、發癢、乾燥感、不適感、打噴嚏、嗅覺異常、化膿症狀（因毛根感染造成化膿、疼痛及紅腫）</p> <p>喉嚨：刺激感、異物感、化膿症狀（因感染造成喉嚨深處有白色化膿、疼痛及紅腫）</p> <p>皮膚：發疹、發紅，發癢，腫脹</p> <p>精神神經系統：頭痛，頭暈</p> <p>消化器官：噁心、嘔吐，腹瀉，食欲不振</p>

	<p>其他：哮喘發作，眼睛痛，視力模糊，心悸，血壓上升</p> <p>極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。</p> <p>&lt;症狀名稱：病徵&gt;</p> <p>休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。</p> <p>3. 使用後，出現頭部、額頭和臉頰等感到疼痛，鼻涕呈現黃色和綠色等異常症狀時，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者（有可能併發其他疾病。）</p> <p>4. 即使使用 1 週左右（1 天最多能夠使用 4 次（噴霧 8 下）），症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p>
添加劑	纖維素、纖維素膠、丙二醇、甘油、聚山梨醇酯 80、苯扎氯銨、檸檬酸、香料（含薄荷醇）
其他	<p>&lt;使用方法&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鼻孔化膿的人不能使用。</li> <li>2. 使用前請輕輕地擤鼻涕。請放輕鬆，不要過於緊張。</li> <li>3. 輕輕搖晃容器後打開蓋子，如圖所示握住容器。（使用前先按壓數次，直到藥液呈霧狀噴灑為止）</li> <li>4. 噴嘴前端輕輕放入鼻腔內，每次使用時按壓一下使藥液噴灑。另一邊的鼻腔也以相同步驟使用。</li> <li>5. 為保持容器清潔，使用後與鼻子接觸的部分請擦拭乾淨後蓋上蓋子。</li> </ol> <p>&lt;使用注意事項&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前請先擤鼻涕並保持鼻腔通暢。</li> <li>2. 使用前輕輕搖晃容器後打開蓋子。</li> <li>3. 容器橫放使用時藥液將無法霧化，因此請務必垂直使用。</li> <li>4. 容器前端若沾黏鼻水等可能污染藥液，請特別注意。</li> <li>5. 噴嘴請勿朝向鼻中隔，請朝鼻腔內部直向放入後噴灑。尤其是慣用右手的人較易朝向右鼻中隔，慣用左手的人較易朝向左鼻中隔，請特別注意。※鼻中隔：位於鼻孔中間，區隔左右鼻腔的隔牆。</li> <li>6. 使用後噴嘴周圍以面紙擦拭乾淨，保持清潔。</li> <li>7. 請千萬不要以針類物品刺穿噴嘴前端，若折斷將非常危險。</li> </ol>
保管及使用上的注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。</li> <li>(2) 請保管於兒童拿不到的地方。</li> <li>(3) 請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）。</li> <li>(4) 請勿與他人共用。</li> <li>(5) 請勿使用超過有效期限的產品。即使尚未超過有效期限，開封後也請盡早使用</li> </ol>
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂 1-5-27
風險類別	指定第二類醫藥品
多語種產品信息的免責聲明	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。</li> <li>• 多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。</li> <li>• 多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。</li> <li>• 針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。</li> </ul>