

藥品類別	一般用医薬品
藥效學分類	動脈硬化藥
產品名稱	ラングロン LUNGRON
產品功能	<ul style="list-style-type: none"> ●可降低血液中的膽固醇指標，具有改善血清膽固醇水準的效果。 血液中的膽固醇是形成體內細胞及荷爾蒙不可或缺的重要物質，但如果血液中的膽固醇過多，它們將堆積在血管壁，導致動脈硬化。 ●核黃素四丁酸酯可防止體內產生膽固醇，並可將產生的膽固醇排出體外，具有改善血清膽固醇水準的效果。 ●該紅紫色軟膠囊是將核黃素四丁酸酯溶入植物油而製成。
療效或效果	改善血清高膽固醇
用法及用量	<p>按照下述 1 次服用量，1 天服用 2 次。</p> <p>[年齡：1 次服用量：1 天服用次數] 成人（15 周歲以上）：1 顆：2 次 未滿 15 歲：請勿服用</p>
用法及用量相關的注意事項	<p>(1)請嚴格遵守規定的用法、用量。</p> <p>(2)要改善血清膽固醇水準，食療法非常重要，因此請在服用本藥物的同時，也採取食療法。</p>
成分及分量	<p>每 2 膠囊 核黃素四丁酸酯：60 mg：可抑制肝臟合成膽固醇，並透過血液中膽固醇排泄或異化作用而改善血脂代謝。此外，還可增加 HDL（有益）膽固醇。基於這些功效，可有效改善血液中的膽固醇水準。</p>
使用上的注意事項	<p>■諮詢事項</p> <p>1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>(1)正在接受醫師治療的人。 (2)曾因藥品等，引發過敏症狀的人。</p> <p>2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p> <p style="padding-left: 20px;">〈關係部分：病徵〉 皮膚：發疹、發紅，發癢 消化器官：噁心，胃部不適感，胸口灼熱</p> <p>3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p> <p style="padding-left: 20px;">腹瀉</p> <p>4. 即使服用一陣子，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p>
添加劑	中鏈甘油三酯、D- δ -生育酚、明膠、甘油、D-山梨醇、對羥基本甲酸酯、氧化鈦、紅 106 號、黃 5 號
保管及使用上的注意事項	<p>(1)請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。</p> <p>(2)請保管於兒童拿不到的地方。</p> <p>(3)請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）。</p> <p>(4)請勿使用超過有效期限的產品。</p> <p>(5)膠囊易受潮，請注意避免濕手等接觸。</p>
其他	<p>〈如果您的膽固醇水平高。〉 須注意日常飲食。</p> <p>1、均衡攝取動物脂肪（肉類及奶油中所含的物質）與植物脂肪（橄欖及大豆中所含的物質）。</p> <p>2、攝取富含維生素 E 的糙米、大豆等。</p> <p>3、控制膽固醇較高的蛋類、鰻魚、魷魚、肝臟等。</p> <p>4、控制鹽分、糖分。</p> <p>5、多攝取食物纖維。</p> <p>6、睡前攝取過量卡路里，易形成多餘膽固醇，因此應控制夜宵。</p>
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂 1-5-27
風險類別	3 類藥品
多语种产品信息的免责声明	<ul style="list-style-type: none"> ・本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。 ・多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。 ・多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。 ・針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。