

药品类别	一般用医药品
药效分类	解热镇痛药
产品名称	リングルアイビーα200 RINGL I Ba200
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本品为加入了布洛芬的软胶囊，有效缓解头痛、经痛等痛楚。</li> <li>●有效成分布洛芬溶于液状。</li> </ul>
效能或效果	<ul style="list-style-type: none"> <li>●头痛、牙痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、耳痛、关节痛、神经痛、腰痛、肌肉痛、肩部酸痛、跌打痛、骨折疼痛、挫伤疼痛、月经痛(生理痛)、外伤疼痛的镇痛</li> <li>●恶寒及发烧时的解热</li> </ul>
用法及用量	<p>每次请按下述剂量服用。服用时尽量避免空腹。服用间隔为4小时以上。</p> <p>&lt;年龄：1次服用量：1天服用次数&gt;          成人（15岁以上）：1粒：最多2次限制          未满15周岁：请勿服用</p>
用法及用量相关注意	<p>(1)请严格遵守规定的用法、用量使用。</p> <p>(2)胶囊取出方式          请用手指用力按压装入胶囊的PTP包装的凸起部，压破反面的铝箔后取出胶囊服用。          (如果不小心误吞铝箔，可能发生铝箔卡在食道粘膜等意外事故，敬请注意。)</p>
成分及分量	<p>每1胶囊中          布洛芬：200mg：缓解头痛、经痛、牙痛等痛楚。发烧时的解热退烧。</p>
使用注意事项	<p>■禁止事项          (若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故)</p> <p>1. 下述人群不要服用</p> <p>(1)曾因本品或本品所含成分引起过过敏症状的人。</p> <p>(2)因服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药而引发过哮喘的人群          (可能诱发哮喘)</p> <p>(3)未满15岁的儿童</p> <p>(4)正在医疗机关接受以下疾病的治疗或投药的人。          胃及十二指肠溃疡、血液系统疾病、肝脏病、肾脏病、心脏病、高血压、正在使用齐多夫定(立妥威)的人          (对于患有胃及十二指肠溃疡、肝脏病、肾脏病的人，可能导致病情恶化)          (对于患有血液系统疾病的人，可能出现白血球减少、血小板减少等情况，可能导致病情进一步恶化)          (对于患有心脏病的人，可能导致心力衰竭进一步恶化)          (对于患有高血压的人，可能导致血压进一步上升)</p> <p>(5)预产期在12周以内的孕妇</p> <p>2. 在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品          其他解热镇痛药、感冒药、镇静药</p> <p>3. 服用前后不要饮酒          (一般情况下由于酒精会促进药物的吸收与代谢，可能导致副作用的出现或增强毒性，因此可能造成重度肝功能障碍。)</p> <p>4. 不要长期连续服用</p> <p>■咨询事项</p> <p>1. 以下人群在服用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者</p> <p>(1)正在接受医师或牙科医师治疗的人群</p> <p>(2)孕妇或有其可能性的人群</p> <p>(3)哺乳期人群</p> <p>(4)老年人          (一般情况下由于老年人的生理功能下降，容易出现较强的副作用。)</p> <p>(5)因药物等出现过过敏症状的人群</p> <p>(6)拥有以下症状的人群或患有过以下疾病的人群          胃及十二指肠溃疡、血液系统疾病、肝脏病、肾脏病、心脏病、高血压、支气管哮喘(可能诱发支气管哮喘)、全身性红斑狼疮(可能造成肾功能障碍等导致该疾病的症状恶化，或引发无菌性脑膜炎)、混合结缔组织病(可能引发无菌性脑膜炎)、溃疡性大肠炎、克隆氏症(曾有病情恶化的报告)</p> <p>2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者</p> <p>&lt;关系部分：病征&gt;</p> <p>皮肤：起疹、发红，发痒，出现淤青</p> <p>消化系统：恶心、呕吐，食欲不振，胃痛，胃部不适，口腔溃疡，烧心，胃胀，肠胃出血，腹痛，腹泻，血便</p> <p>精神神经系统：头晕，嗜睡，失眠，情绪不畅</p> <p>循环系统：心悸</p> <p>呼吸系统：气短</p>

	<p>其他：视线模糊，耳鸣，浮肿，鼻血，牙龈出血，出血不止，出血，背部疼痛，体温过低，全身无力</p> <p>偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。</p> <p>&lt;症状名称，病征&gt;</p> <p>休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。</p> <p>史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。</p> <p>肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。</p> <p>肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。</p> <p>无菌性脑膜炎：因颈部抽筋出现剧烈头痛、发烧、恶心及呕吐等症状。（尤其在接受全身性红斑狼疮或混合结缔组织病治疗的人群中多有该症状的报告案例。）</p> <p>哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。</p> <p>再生障碍性贫血：出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适，难以站稳、血尿等症状。</p> <p>粒细胞缺乏症：出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。</p> <p>3. 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者 便秘，口腔干燥</p> <p>4. 服用后可能会出现体温下降、无力（虚脱）、手足变凉（四肢冰冷）等症状。此时请立即停止服药，用毛毯等保温，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者</p> <p>5. 若服用3~4次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者</p>
添加剂	聚山梨醇酯80，羟基化K，明胶，琥珀酸化明胶，来自玉米淀粉的糖醇，栀子色素
保管及使用注意事项	<p>(1) 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所。</p> <p>(2) 保管在儿童无法触及的地方。</p> <p>(3) 不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。</p> <p>(4) 请勿服用超过有效期的产品。</p> <p>(5) 由于胶囊易于吸湿，故请注意不要用潮湿的手等触摸。</p>
其他	
生产销售公司	佐藤制药有限公司 东京都港区元赤坂1丁目5番27号
风险类别	指定第二类医药品
多语种产品信息的免责声明	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 本产品以作为在日本国内进行销售及使用的目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。</li> <li>· 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。</li> <li>· 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。</li> <li>· 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任。</li> </ul>