

의약품 구분	일반 의약품
약효 분류	해열 진통제
제품 이름	ルミフェン LUMIFEN
제품의 특징	<ul style="list-style-type: none"> ●비스테로이드계 소염 진통제인 알미노프로펜이 배합되어 있습니다. ●염증을 가라앉히고 관절염 등의 증상을 억제하는 작용 및 열을 내리는 작용이 있습니다.
효능 또는 효과	<p>1)관절통·요통·어깨 결림통·인후통·두통·치통·발치 후 동통·이통·신경통·근육통·타박통· 골절통·염좌통· 월경통(생리통)·외상 통의 진통</p> <p>2) 오한·발열 시의 해열</p>
용법 및 용량	<p>증상이 나타났을 경우, 아래의 1 회 복용량을 가급적 공복시를 피해 복용합니다. 복용 간격은 4 시간 이상으로 하여 주십시오.</p> <p><연령: 1 회 복용량: 1 일 복용 횟수> 성인 (15 세 이상): 1 정: 2 회를 한도로 함 (단, 다시 증상이 나타난 경우는 3 회째를 복용할 수 있습니다) 15 세 미만: 복용하지 마십시오</p>
용법 및 용량에 관한 주의	<p>(1)정해진 용법·용량을 준수해 주십시오.</p> <p>(2) 정제 꺼내는 방법 정제가 들어 있는 PTP 시트의 볼록한 부분을 손가락으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일을 찢어 꺼낸 후 복용해 주십시오. (실수로 그대로 삼키거나 하면 식도 점막에 꽃히는 등 예상치 못한 사고로 연결됩니다.)"</p>
성분 및 분량	<p>1 정 중 알루미늄 노 프로 펜 : 200 mg : 염증을 가라앉히고 관절통 등의 증상을 억제하는 작용 및 열을 내리는 작용이 있습니다.</p>
사용상의 주의	<p>■해서는 안 되는 것 (지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어나기 쉽다) 1. 다음에 해당하는 사람은 복용하지 말 것 (1)본제 또는 본제 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 분. (2)본제 또는 다른 해열 진통제, 감기약을 복용하여 천식을 일으킨 적이 있는 사람. (3)15 세 미만의 소아. (4)다음과 같은 진단을 받은 분. 위·십이지장 궤양 (5)출산 예정일 12 주 이내의 임산부.</p> <p>2. 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것 다른 해열 진통제, 감기약, 진정제</p> <p>3. 복용 후 졸음, 현기증, 일시적인 시력 저하 등이 나타난 경우는 차량 또는 기기류의 운전 조작을 하지 마시기 바랍니다.</p> <p>4. 복용 전후에 음주하지 않을 것</p> <p>5. 장기간 연용하지 않을 것</p> <p>■ 상담할 내용 1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것 (1)의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람. (2)임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람. (3)수유 중인 사람. (4)고령자. (5)약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람. (6)다음의 진단을 받은 사람. 혈액 관련 질병, 간장병,신장병, 심장병, 기관지 천식, 궤양성 대장염, 크론병 (7) 다음 병에 걸린 적이 있는 사람. 위·십이지장 궤양, 혈액 관련 질병, 간장병,신장병</p> <p>2. 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과 의사 약사 또는 등록판매자와 상담할 것 <관계부위 : 증상> 피부:발진·발적, 가려움 소화기:위통, 복통,위, 복부 불쾌감,메스꺼움·구토, 식욕 부진, 더부룩함, 입마름,구내염 정신신경계:졸음,구내염 쓰라림,손가락 저림,목 쉼,휘청거림,현기증 순환기: 두근거림 호흡기:숨이 참 기타:부종,발열,코피,미각 장애,탈모,일과성 시력 저하</p> <p>드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.</p>

	<p><증상의 명칭 : 증상></p> <p>쇼크(아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목천소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.</p> <p>피부 점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증: 고열, 눈의 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적 등이 지속되거나 급격히 악화된다.</p> <p>간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.</p> <p>홍피증 (박리성 피부염): 고열을 동반한 발진, 발적, 가려움이 전신의 피부에 나타남.</p> <p>출혈성 쇼크: 맥박수가 증가하고 얼굴색이 창백해지며 손발이 차갑고 식은 땀이 남.</p> <p>혈액 장애 (재생 불량성 빈혈, 무과립구증): 인후통, 발열, 전신의 나른함, 얼굴이나 눈꺼풀 뒷쪽이 하얗게, 쉽게 출혈이 발생함 (잇몸 출혈, 코피 등), 시퍼런 멍이 듦 (눌러도 색이 없어지지 않음) 등이 나타난다.</p> <p>혈액 장애 (용혈성 빈혈): 안색이 나빠지고 쉽게 피곤하며 나른함, 두근거림, 숨이 참이 나타남.</p> <p>신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통(마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다.</p> <p>간질성 폐렴: 계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.</p> <p>울혈성 심부전: 전신의 나른함, 두근거림, 숨이 참, 흉부의 불쾌감, 가슴 통증, 현기증, 실신 등이 나타남.</p> <p>무균성 뇌막염: 목덜미가 당기는 심한 두통, 발열, 메스꺼움·구토 등이 나타난다. (이러한 증상은 특히 전신성 홍반성 낭창 또는 혼합성 결합 조직 질환의 치료를 받고 있는 사람에게서 많이 보고되고 있다.)</p> <p>천식: 숨을 쉴 때 색색, 휘휘과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.</p> <p>4. 복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.</p> <p> 변비, 설사</p> <p>5. 1~2 회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것</p>
<p>첨가물</p>	<p>유당, 옥수수 전분, 히드 록시 프로필 셀룰로오스, 탈크, 스테아린산 Mg, 히뿌로 메로스 매크로 득점, 흰 설탕, 탄산 Ca, 포비돈, 산화 티탄, 나우 바로우</p>
<p>보관 및 취급상의 주의</p>	<p>(1)직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. (2)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. (3)다른 용기에 옮겨 담지 않을 것(오용의 원인이 되거나 품질이 바뀌게 된다). (4)사용 기한이 지난 제품은 복용 하지 마십시오.</p>
<p>기타</p>	
<p>제조 판매 회사</p>	<p>사토 제약 주식회사 도쿄도 미나토 구 모토 아카사카 1 초메 5 번 27 호</p>
<p>위험 구분</p>	<p>지정제 2 류의약품</p>
<p>다국어 제품 정보에 대한 고지 사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다. · 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다. · 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다. · 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.